

عنوان مقاله:

بررسی تغییرات شاخصهای رسیدگی در مراحل پایانی رشد میوه انار

محل انتشار:

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 2

نویسندگان:

عبدالکریم زارعی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تهران

ذبیح اله زمانی - دانشیار دانشگاه تهران

محمدرضا فتاحی مقدم - استادیار دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

انار از جمله درختان میوه بومی ایران است که با میزان سطح زیرکشت 63000 هکتار و تولید سالانه بیش از 700000 تن بیشترین سطح زیرکشت و تولید این میوه را در دنیا به خود اختصاص داده است بررسی روند رشد و تغییرات در میوه انار به ویژه در مراحل پایانی رسیدن میوه برای آگاهی از تغییرات در اواخر رشد و تعیین بهترین زمان برداشت این میوه با توجه به طبیعت نافرار گرای این میوه و همچنین جلوگیری از صدمات آخر فصل از جمله ترکیبگی انار بسیار مهم می باشد در این تحقیق روند تغییرات چندین عامل مهم در تعیین رسیدگی میوه انار از جمله میزان اسیدیته قابل تیتراسیون ، قند، انتوسیانین ، وزن میوه و وزن اریل مورد بررسی قرار گرفت. تعداد پنج میوه به عنوان تکرار از 39 نمونه ژنوتیپ انار طی سه مرحله در دوماه آخر رشد میوه برداشت شده و صفات مربوطه ثبت شد.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/100133>

