

عنوان مقاله:

بررسی مقایسه ای سبک های دفاعی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی

محل انتشار:

فصلنامه پرستاری دیابت زابل، دوره 6، شماره 1 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

جعفر حسنی - دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

فرشید علی پور - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

لیلا عبدالرحیمی نوشاد - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

الهه بدایق - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

صابر سعیدپور - دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مظاهر بدایق - دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: دیابت از مهمترین معضلات حوزه سلامت می باشد که جنبه های روانشناختی آن کمتر موردتوجه پژوهشگرانواقع شده است، یکی از این عوامل روانشناختی موثر، سبک های دفاعی میباشد، که نقش تعیین کننده ای در رفتارهای سلامت، اختلال های روانشناختی و طیف وسیعی از اختلال های روانتی دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای سبک هایدفاعی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی بود. مواد و روش ها: در چارچوب یک طرح علی/مقایسه ای با استفاده از نمونه گیری در دسترس 43 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 از مراکز دیابت و کلینیک های تخصصی غدد استان تهران بر اساس ملاک های ورود انتخاب شدند، گروه غیر دیابتی نیز با همتاسازیدر متغیرهای جمعیت شناختی انتخاب گردیدند، از پرسشنامه سبک های دفاعی و فرم اطلاعات جمعیت شناختی جهت گردآوریاطلاعات استفاده گردید. داده ها از طریق تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بیماران دیابتی از سبک های دفاعی رشدنیافته دلیل تراشی، فرافکنی، انکار، تفرق، نارزنده سازی، گذار به عمل، جسمانی سازی، خیال پردازی، لایه سازی، جابه جایی، پرخاشگری منفعلانه، مجزاسازی و سبک دفاعی نورویتیکتشکل واکنشی بیشتر استفاده می کنند. علاوه بر این، بیماران مبتلا به دیابت از سبک های دفاعی رشدنیافته والاگرایی و شوخ طبعیکمتری بهره می گیرند. بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بیماران دیابتی از سبک دفاعی رشدنیافته و نورویتیک به میزان بیشتر و ازسبک دفاعی رشدیافته به میزان کمتری در مقایسه با افراد عادی استفاده می کنند، از نتایج پژوهش حاضر می توان در شناختو طراحی بهتر برنامه های مداخله ای روانشناختی در این گروه از بیماران استفاده شود.

کلمات کلیدی:

بیماری، بررسی مقایسه ای، سبک های دفاعی، دیابت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1004919>



