

عنوان مقاله:

بررسی مصرف قرص ضد بارداری و عوارض شایع یائسگی در زنان یائسه

محل انتشار:

فصلنامه زن و فرهنگ، دوره 2، شماره 4 (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

ناهید حسین عباسی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه پرستاری و مامائی، اهواز، ایران

پروین احسانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه پرستاری و مامائی، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:

هدف از این پژوهش مقطعی توصیفی بررسی مصرف ocp و ایجاد عوارض گرگرفتگی و استئوپروز در زنان یائسه بوده است. تعداد 329 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی به صورت تصادفی به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. آنها بواسطه سابقه مصرف یا عدم مصرف ocp ترکیبی به مدت بیش از یکسال، به دو گروه تقسیم گردیدند. ابزار پژوهش فرم پرسشنامه ای حاوی چندین سوال در رابطه با اهداف ویژه بود. این دو گروه از نظر وجود عوارض یائسگی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سن یائسگی در اکثر افراد (9/17%) 50 سالگی و در اقلیت آنان (1/2%) 44 سالگی بوده است. روش پیشگیری در 3/28% از افراد قرص ترکیبی بوده و 7/71% افراد از روشهای دیگر مانند طبیعی، کاندوم وسیله داخل رحمی و لوله بستن استفاده می کردند. 7/68% افراد اظهار ابتلا به گرگرفتگی داشتند و در 41% آنها پوکی استخوان به کمک MRI توسط پزشک تشخیص داده شده بود. همچنین عارضه گرگرفتگی و پوکی استخوان با مصرف قرص ضد بارداری بی ارتباط می باشد.

کلمات کلیدی:

یائسگی، پوکی استخوان، گرگرفتگی، ocp، زنان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1023806>

