

عنوان مقاله:

تغییرات شیوع و اپیدمیولوژی سرطان های دستگاه تناسلی زنان در شمال شرق ایران در بررسی 35 ساله

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 22، شماره 12 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

دکتر سیده سمانه حسینی - رزیدنت گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر زهره یوسفی - استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر مریم عمادزاده - متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر فاطمه همایی شانديز - دانشیار گروه انکولوژی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: تومورهای زنان، عامل مهم مرگ و میر زنان در جهان هستند. با توجه به اهمیت شناخت اپیدمیولوژیک سرطان های زنان به صورت منطقه ای جهت برنامه ریزی اقدامات پیشگیری، مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه تناسلی زنانه مراجعه کننده به مراکز تخصصی انکولوژی مشهد در سال های 95-1361 انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه مقطعی پس از بررسی تمام پرونده های موجود در طی 35 سال اخیر، اطلاعات بیماران استخراج و ثبت گردید. زمان مطالعه به 4 دوره (سال 69 و قبل از آن، سال 70-79، سال 80-89 و سال 90-95) تقسیم بندی شد. فراوانی نسبی، میانگین سن زمان تشخیص و روند 35 ساله مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوتر، آنووا و شفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در 2953 بیمار مورد بررسی، میانگین سنی $32/49 \pm 69/13$ سال بود. بیشترین میانگین سنی در بیماران با سرطان جسم رحم ($21/52 \pm 49/12$ سال) و کمترین در بیماران با سرطان تخمدان ($09/46 \pm 09/16$ سال) مشاهده شد. میانگین سن تشخیص سرطان تخمدان در طی سه دهه اخیر به طور معناداری افزایش ($>001/0p$) و در سرطان سرویکس کاهش داشت ($p=017/0$). بیشترین فراوانی نسبی مربوط به سرطان سرویکس با 1161 مورد (3/39%) و سپس سرطان تخمدان با 1080 مورد (6/36%) بود. توزیع فراوانی انواع سرطان در طی دهه های مختلف نیز اختلاف معناداری داشت ($>001/0p$). نتیجه گیری: سرطان سرویکس فراوان ترین سرطان در بین بیماران این مطالعه بود. میانگین سن تشخیص در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان افزایش و در مبتلایان به سرطان سرویکس کاهش یافته است. با توجه به قابلیت پیشگیری از سرطان سرویکس، توصیه به توجه بیشتر غربالگری این سرطان می شود.

کلمات کلیدی:

ایران، زنان، سرطان آندومتر، سرطان تخمدان، سرطان سرویکس، مشهد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1030314>



