

عنوان مقاله:

گزارش موردی پریتونیت عفونی گربه سانان همراه با علائم چشمی

محل انتشار:

فصلنامه دامپزشکی، دوره 33، شماره 2 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

فرنوش بخشائی شهربابکی - دانشجوی فارغ التحصیل، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

مهديه رضائی - گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

شهرزاد عزیزی - گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:

بیماری ویروسی پریتونیت عفونی گربه سانان (FIP) مشابه پن لکوپنی یکی از علل مهم مرگ و میر گربه ها بشمار می آید. این بیماری به دو شکل خشک و مرطوب مشاهده می شود. به طور معمول تظاهر چشمی بیماری همراه با شکل خشک است. این گزارش درمانگاهی دربرگیرنده دو مورد گربه مبتلا به بیماری FIP به شکل مرطوب و خشک با علائم چشمی است. کموز، ترشحات فیبری، پرخونی عروق ملتحمه، گلوکوم دو طرفه چشم، خونریزی شبکیه و در نهایت کوری، علائم گربه اول این گزارش با درگیری شکل خشک بیماری بود که به دلیل عدم توجه، منجر به انتقال ویروس به گربه دوم و شکل گیری فرم مرطوب گردیده بود. تشخیص قطعی بیماری در شکل مرطوب FIP با هیستوپاتولوژی تایید شد. سپس، احتمال انتقال آلودگی به گربه دوم توسط گربه اول با علائم چشمی با آزمایش کروماتوگرافی ارزیابی شد که کرونا ویروس مثبت بود. علائم چشمی FIP به دلیل تشابه با سایر بیماری های سیستمیک مانند ویروس لوسمی گربه سانان (FeLV)، ویروس نقص ایمنی گربه سانان (FIV)، توکسوپلاسموز و برخی از بیماری های قارچی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. عدم توجه به بیماری، انتقال به سایر حیوانات را به همراه خواهد داشت. این مطالعه اولین گزارش علائم چشمی شکل خشک FIP است.

کلمات کلیدی:

پریتونیت عفونی گربه سانان، شکل مرطوب، شکل خشک، علائم چشمی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1038441>

