

عنوان مقاله:

پیش بینی کیفیت زندگی براساس شدت علایم ترک در افراد وابسته به مواد افیونی: نقش واسطه ای عود

محل انتشار:

همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

لیلا محمدی - دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مرضیه شفیعی - دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

خلاصه مقاله:

کیفیت زندگی، یکی از پیامدهای مهم سلامتی به شمار می رود که جهت موارد ی همچون ارزیابی مداخلات بهداشتی، اندازه گیری آن در بسیاری از پژوهش های سلامتی ضروری است، هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کیفیت زندگی براساس شدت علایم ترک در افراد وابسته به مواد افیونی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای عود بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 200 نفر از افراد وابسته به مواد افیونی که در مراکز میان مدت استان تهران و البرز اقامت داشتند به صورت در دسترس انتخاب و با پرسشنامه های کیفیت زندگی (SF-36) وارو شربون (1992)، پرسشنامه ی پیش بین بازگشت (عود) رایت و همکاران (1993) و پرسشنامه ی شدت علایم ترک محمدی، حبیبی و مهدی پور (1394) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری (SEM) نشان دهنده ی آن بود که رابطه ی بین شدت علایم ترک و کیفیت زندگی، عود و کیفیت زندگی منفی و معنادار بود. همچنین رابطیه بین شدت علایم ترک و کیفیت زندگی به واسطه متغیر عود نیز معنادار بود. نتایج نشان داد که مدلساختاری مربوط به کیفیت زندگی براساس شدت علایم ترک و با میانجیگری عود در قالب یک مدل، این متغیر را در سو مصرف کنندگان مواد پیش بینی می کند.

کلمات کلیدی:

شدت علایم ترک، کیفیت زندگی، عود و مواد افیونی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1115362>

