

عنوان مقاله:

اثر تیمارهای مختلف در تولید نهال ارس *juniperus excelsa* توسط بذر

محل انتشار:

همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار (سال: 1379)

تعداد صفحات اصل مقاله: 20

نویسندگان:

سودابه علی احمد کروری - اعضای گروه تحقیقات اکوفیزیولوژی و بیوتکنولوژی بخش تحقیقات جنگل موسس

مریم تیموری

مصطفی خوشنویس

محمد متینی زاده

خلاصه مقاله:

استانهای مازندران و گلستان در منطقه هیرکانی مجموعه متنوعی از رویشگاههای ارس را در سطح کشور دربردارند در این استانها بیشتر گونه های ارس بومی ایران حضور دارند و هرگونه برحسب نیاز اکولوژیک در منطقه محدود یا گسترده رویش یافته است و از ارتفاع 1500 متر تا 2700 متر از سطح دریا درجهتهای مختلف جای گرفته است و تیپهایی را به صورت خالص یا آمیخته با سایر گونه های جنگلی به وجودآورده است بطور کلی استانهای مذکور به دلیل قرارگرفتن در خط ساحلی دریای خزر و متاثر بودن از رطوبت خیزی و تغییرات ارتفاعی دارای اقلیمهای متنوعی هستند. درجنگلهای جلگه ای پایین بند و میان بند گونه های سرد *juniperus* جای چندانی نداشته و تنها در دو منطقه یکی در شرق جنگل گلستان و دیگری در جاده هراز در منطقه پنجاب تا ارتفاع 750 متری پایین آمده است بهترین نمونه رویشگاهی آن در سطح کشور در حاجی آباد و گردنه چهار باغ گرگان از ارتفاع 1850 متر به بالا وجود دارد. علاوه بر رویشگاههای به نسبت وسیعی که در این دو استان وجود دارد سطوح وسیعی از دامنه ها و ارتفاعات کوهستانها ی ایران زیرپوشش گونه های این سرده قرارداد که تا دو میلیون هکتار تخمین زده می شود.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/113851>

