

عنوان مقاله:

بررسی رابطه بین درون قرمزی و درون تهی با قطر برابر سینه در گونه راش در منطقه ویسر

محل انتشار:

همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار (سال: 1379)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسنده:

جواد سوسنی - کارشناس ارشد جنگلداری و مرکز آموزش جهاد سازندگی استان لرستان خرم آباد

خلاصه مقاله:

به منظور بررسی ارتباط بین درون قرمزی و درون تهی درخت راش با قطر برابر سینه و سایر عوامل رویشگاهی مانند ارتفاع از سطح دریا شیب زمین و جهات جغرافیایی این بررسی در منطقه ویسر از جنگلهای شمال کشور انجام شد. برای انجام این بررسی در 400 درخت نمونه برداری شده و قطع شده میزان درون قرمزی و درون تهی مورد بررسی دقیق قرارگرفت که از این تعداد 277 درخت واحد درون قرمزی و درون تهی شناخته شده و عوامل مورد نظر در آنها اندازه گیری شدند. در این بررسی بین عوامل میانگین قطر درون تهی و قطر برابر سینه و همچنین بین حداکثر قطر درون قرمزی و قطر برابر سینه در سطح 99% اعتماد ارتباط معنی داری حاصل شد. همچنین در این بررسی بین عوامل درون تهی و درون قرمزی با عوامل شیب ارتفاع از سطح دریا و جهات جغرافیایی هیچ گونه ارتباط معنی داری حاصل نشد.

کلمات کلیدی:

راش، قطر برابر سینه، درون قرمزی، درون تهی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/113855>

