

عنوان مقاله:

مقایسه سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بر حسب انتخاب روش زایمان در زنان نخست زای شهر بندرعباس

محل انتشار:

مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره 4، شماره 1 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

سکینه دادی پور - مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

تیمور آقا ملایی - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

علی رمضانخانی - گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

علی صفری مرادآبادی - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: عمل سزارین گسترده‌ترین عمل جراحی برای زایمان در جهان می‌باشد و میزان مرگ و میر ناشی از آن، 7 برابر زایمان طبیعی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بر حسب انتخاب روش زایمان در زنان نخست‌زای شهر بندرعباس انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی بود که روی 210 مادر باردار نخست‌زای مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر بندرعباس در سال 1395 انجام شد. روش نمونه‌گیری ترکیبی از روش‌های خوشه‌ای و تصادفی ساده بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، آگاهی و سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بود. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آماره‌های توصیفی و آزمون‌های Chi square و آنالیز واریانس یک‌طرفه در نرم‌افزار SPSS 18 تحلیل شد. یافته‌ها: براساس یافته‌های به‌دست آمده، میانگین سنی مادران باردار شرکت‌کننده در این پژوهش، 24.56 ± 4.96 سال بود. 63.8 درصد از مادران زایمان طبیعی و 36.2 درصد عمل سزارین انجام داده بودند. همچنین میانگین نمره آگاهی مادران از مزایا و معایب روش‌های زایمانی، 63/6 درصد برآورد گردید. اختلاف آماری معناداری نیز در تمامی سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بین روش‌های زایمان انتخابی مادران مشاهده شد ($P < 0.05$). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، برگزاری مداوم کلاس‌های آموزشی در زمینه عوارض و خطرات سزارین توسط مراکز بهداشتی در کنار مراقبت‌های دوران بارداری، شناسایی موانعی که برای انتخاب زایمان طبیعی بر سر راه مادران قرار گرفته و اقدام در برطرف کردن آن‌ها با هدف اعتماد هرچه بیشتر مادران برای انجام زایمان به روش طبیعی می‌تواند در کاهش عمل‌های سزارین غیرضروری مؤثر واقع شود.

کلمات کلیدی:

Cesarean Section, Health Belief Model, Primiparous Women, الگوی اعتقاد بهداشتی؛

روش زایمان؛ زنان نخست‌زا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1139693>



