

عنوان مقاله:

اثرات خالص وقوع عود بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک تحلیل تعقیبی با کنترل آماری بالا

محل انتشار:

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، دوره 6، شماره 3 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

قاسم صالح پور - Shiraz University

جواد ملازاده - Shiraz University

خلاصه مقاله:

مقدمه عودها بارزترین خصیصه بیماری مولتیپل اسکلروزیس می‌باشند که می‌توانند اثرات مختلفی بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران داشته باشند. از این رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات خالص وقوع عود بر خستگی و کیفیت زندگی این بیماران می‌باشد. مواد و روش‌ها در یک پژوهش مقطعی، 162 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (در سه گروه فاقد عود، 1-2 بار عود و ≥ 3 بار عود) توسط نمونه‌گیری پیاپی انتخاب و با استفاده از سیاهه متغیرهای بالینی و جمعیت شناختی، پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت و مقیاس شدت خستگی به همراه ترازوی یکسان فنی عقربه‌ای و متر نواری مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون کای اسکور، تحلیل واریانس یک‌طرفه، تحلیل واریانس چند متغیره، تحلیل کوارینانس چندمتغیره و آزمون‌های تعقیبی حداقل تفاوت معنی‌دار فیشر و شفه تحلیل شدند. یافته‌ها تحلیل‌های کنترل شده نشان داد که اثرات وقوع عود بر کارکرد فیزیکی، سرزندگی، کارکرد اجتماعی، سلامت روانی و مولفه‌های فیزیکی و روانی کیفیت معنی‌دار است ($P < 0/05$). پیگیری تفاوت بین میانگین‌ها در گروه‌های عود حاکی از آن بود که در کلیه متغیرهای معنی‌دار شناسایی شده، بیماران با ≥ 3 بار عود از نمرات میانگین پایین‌تری برخوردار بودند ($P < 0/05$). در این میان، تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مختلف عود از نظر میزان خستگی مشاهده نشد ($0/05$)

کلمات کلیدی:

Multiple Sclerosis, Relapse, Quality of Life, Fatigue, مولتیپل اسکلروزیس, عود, کیفیت زندگی, خستگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1157706>

