

عنوان مقاله:

غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر همدان

محل انتشار:

مجله علمی پژوهش، دوره 18، شماره 2 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

پریسا پارسا - *Chronic Diseases (Home Care) Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran*

سودابه آقا بابایی - *Assistant Professor, Maternal and Child Care Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran*

قدرت الله روشنایی - *Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran*

سروه رحمانی - *School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran*

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: سرطان دهانه رحم ششمین سرطان شایع محسوب می‌شود و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است. لذا اهمیت برنامه‌های غربالگری همچون آزمایش غربالگری دهانه رحم در تشخیص اولیه این بیماری مشخص می‌گردد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان یائسه مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر همدان انجام گردید. مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، 108 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر همدان از طریق نمونه گیری خوشه ای در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، جمع آوری داده ها به روش مصاحبه از زنان و بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه شامل دو بخش بود. پس از جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 صورت گرفت و سطح معنی داری آزمون ها 5 درصد بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین سنی افراد شرکت کننده 55/39+3/71 سال بود. میانگین تعداد پاپ اسمیر انجام شده توسط زنان 2/21+1/71 بار بود. همچنین 29/6 درصد زنان آزمایش پاپ اسمیر را انجام داده بودند. 27/8 درصد زنان جهت اطلاع از زمان انجام آزمایش پاپ اسمیر به مراکز بهداشتی یا پزشک مراجعه کرده بودند. 18/5 درصد زنان آزمایش پاپ اسمیر را مرتب انجام داده بودند. 13/9 درصد زنان جهت اطلاع از نتیجه آزمایش پاپ اسمیر به مراکز بهداشتی یا پزشک مراجعه می کردند. 10/2 درصد در صورت مشکوک بودن نتیجه آزمایش پاپ اسمیر، جهت درمان به پزشک مراجعه کرده بودند. بین تعداد زایمان و مدت یائسگی با انجام غربالگری ارتباط آماری معنی دار وجود داشت. اما بین سایر متغیرها با انجام غربالگری رابطه آماری معنی دار وجود نداشت. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود در مراکز مشاوره و مراکز خدمات جامع سلامت آموزش هایی به زنان جهت آسرتان دهانه رحم و روش غربالگری آن در زمان مناسب استفاده شود. دادن آگاهی کافی به زنان در خصوص تشخیص زودهنگام توصیه می شود. همچنین پیشنهاد می گردد پژوهش هایی در این راستا با حجم نمونه بالاتر صورت پذیرد؛ همچنین مداخلاتی جهت غربالگری سرطان دهانه رحم و انجام رفتارهای پیشگیری کننده انجام شود.

کلمات کلیدی:

Screening, Cervical Cancer, Postmenopausal Women, Comprehensive Health Centes
غربالگری؛ سرطان دهانه رحم؛ زنان یائسه؛ مراکز خدمات جامع سلامت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1160027>

