

عنوان مقاله:

معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دو منطقه حفاظت شده جنگلی سمسکنده و دشت ناز، ساری، مازندران

محل انتشار:

مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک، دوره 3، شماره 7 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 20

نویسندگان:

فرخ قهرمانی نژاد - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

علیرضا نقی نژاد - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

سید حسین بهاری - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

روح اله اسماعیلی - اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، ساری، ایران

خلاصه مقاله:

مناطق جنگلی سمسکنده و دشت ناز به منظور حفظ و احیای جوامع گیاهی و جانوری بازمانده جنگل های جلگه ای خزر، به عنوان پناهگاه های حیات وحش در استان مازندران (ساری) مصوب گردیده اند. با مطالعه فلور این دو منطقه، تعداد ۲۲۳ گونه گیاهی از ۱۷۵ جنس متعلق به ۶۹ تیره شناسایی گردید. از لحاظ تعداد گونه ها به ترتیب تیره Poaceae با ۳۶ گونه (۱۶٪)، Asteraceae با ۲۳ گونه (۳/۱۰٪) و Lamiaceae با ۱۴ گونه (۳/۶٪) و Rosaceae با ۱۳ گونه (۸/۵٪) مهمترین گونه ها هستند. جنس Carex با ۷ گونه، Euphorbia با ۶ گونه و Geranium با ۵ گونه بزرگترین جنس ها را تشکیل می دهند. از نظر شکل زیستی، بالاترین مقادیر به ترتیب مربوط به تروفیت ها (۳۴٪)، همی کریپتوفیت ها (۲۴٪)، ژئوفیت ها (۲۲٪) و فانروفیت ها (۱۵٪) است. از نظر پراکنش جغرافیایی، بیشترین مقادیر به ترتیب مربوط به پراکنش چند ناحیه ای (۳۲٪)، اروپا-سیبری (۱۹٪)، پراکنش اروپا-سیبری، ایرانی-تورانی و مدیترانه ای (۱۳٪) است. همچنین، ۴ درصد از گیاهان بوم زاد هستند. به دلیل اینکه جنگل های مطالعه شده میراثی از جنگل های بلوط و شمشاد جلگه ای در خزر هستند، حفاظت جدی و مستمر و حذف موارد تهدید و آلودگی از حاشیه جنگل ها الزامی است.

کلمات کلیدی:

پناهگاه سمسکنده، پناهگاه دشت ناز، فلور ایران، منطقه هیرکانی، انتشار جغرافیایی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1207571>

