

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر انواع کود ونسبتهای مختلف کشت مخلوط چاودار و شبدر قرمز برمیزان پروتئین بذر چاودار

محل انتشار:

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

حامد ایمانی خواجه پاشا - دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی

محمود پوریوسف میاندواب - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

عبداله حسن زاده قورت تپه - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

خشنود علیزاده - رئیس مرکز تحقیقات دیممراغه

خلاصه مقاله:

به منظور تعیین اثر کشت مخلوط و نیز انواع کودها برمیزان پروتئین بذر چاودار آزمایش فاکتوریلی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور تیمارهای کودی مختلف چهارسطح و ترکیبهای کشتی متفاوت 5 سطح در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتکشاورزی ساعتلوی ارومیه انجام گرفت نتایج نشان داد که اثرات انواع کودهای استفاده شده نسبت های مختلف کشت و اثرات متقابل آنها برمیزان پروتئین دانه در چاودار موثر است بطوریکه بیشترین درصد پروتئین بذر چاودار در حالت استفاده از ترکیب کودهای هیومیکا و کود زیستی فسفات ه بارور 2 و همچنیننسبت کاشت 50% چاودار و 50% شبدر قرمز بدست می آید جهت افزایش کیفیت بذر چاودار می توان از این الگوی کشت استفاده کرد.

کلمات کلیدی:

شبدر، چاودار، کشت مخلوط

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/123300>

