

عنوان مقاله:

عوامل خطر برای اندومتريت باليني در گاوهای شیری پس از زایمان

محل انتشار:

پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسنده:

فرید مهدقره باغ - دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

خلاصه مقاله:

آلودگی باکتریایی لومن رحم پس از زایمان در بیشتر گاوهای شیری اتفاق می افتد. وجود اندومتريت باليني بیش از سه هفته پس از زایمان به تعادل بین میکروب ها ، ایمنی میزبان و سایر عوامل محیطی یا حیوانی بستگی دارد. مطالعه حاضر به ارتباط اندومتريت باليني با عوامل حیوانی مانند باقی ماندن پرده های جنینی (جفت ماندگی) ، کمک به زایمان و دوقلوها و همچنین آلودگی محیطی به وسیله مدفوع می پردازد. به نظر می رسد عوامل خطر اندومتريت باليني با ترومای دستگاه تناسلی ماده و بهم ریختن موانع فیزیکی عفونت نسبت به آلودگی مدفوع همراه باشد.

کلمات کلیدی:

اندومتريت ، گاو های شیری ، پس از زایمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1235213>

