

عنوان مقاله:

بررسی ارتباط علائم بالینی و آسیب شناسی کلیه در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوسیسستمیک

محل انتشار:

مجله دانشکده پزشکی مشهد، دوره 55، شماره 4 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

نیره سعادت - - دانشیار روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مریم حامی - - استادیار نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

عطاله بهروز اقدم - استاد نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

بهرام نقیب زاده - پزشک خانواده، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه درگیری کلیه یکی از علل مهم مرگ و میر و از کار افتادگی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوسیسستمیک (SLE) می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی بالینی و ارزیابی شدت نفریت لوپوسی و تفکیک انواع پاتولوژیک آن و بررسی تاثیر علل مختلف در پیش آگهی با توجه به منطقه جغرافیایی انجام شده است. روش کار این بررسی توصیفی آینده نگر، از سال ۱۳۸۰-۱۳۸۵ بر ۳۴ مورد مبتلا به SLE که به بخش و درمانگاه داخلی مرکز پزشکی قائم(عج) مراجعه کرده بودند، انجام شد. همه بیماران تحت بیوپسی کلیه قرار گرفته و ارزیابی نمونه ها براساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO) انجام گرفت. ویژگی های فردی، بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک بیماران ثبت شده و عوامل موثر در پیش آگهی لوپوس یا نفریت لوپوسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد. نتایج از ۳۴ بیمار بررسی شده، ۳۲ نفر زن و ۲ نفر مرد بودند. متوسط سن بیماران در زمان تشخیص ۵۵/۱۲ ± ۱۲/۲۵ سال بود. تمام بیماران در زمان مراجعه درگیری کلیه داشتند. شایع ترین ضایعه آسیب شناسی کلیه در این بیماران گلودرونفریت پریفراتیو منتشر بود. کلاس چهار نفریت لوپوسی مهمترین عامل موثر در تعیین پیش آگهی بود (p=۰۰۴). نتیجه گیری شیوع سنی و جنسی نفریت لوپوسی در این منطقه با نقاط دیگر هم خوانی دارد. احتمال بقای ۵ سال بیماران شبیه به مناطق دیگر، اما احتمال بقای ۵ سال کلیه بیشتر از مناطق دیگر است. مطالعه تاکید می کند که بیوپسی کلیه تنها روش قابل دسترسی برای تشخیص و طبقه بندی نفریت لوپوسی است.

کلمات کلیدی:

کلیه، لوپوس اریتماتوسیسستمیک، نفریت لوپوسی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1282357>

