

عنوان مقاله:

گزارش یک مورد گلوموس تومور اولیه معده در یک مرد ۵۹ ساله

محل انتشار:

مجله دانشکده پزشکی مشهد، دوره ۵۴، شماره ۲ (سال: ۱۳۹۰)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۶

نویسندگان:

احمد خسروی - دانشیار بیماریهای داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مهرداد کاتبی - متخصص آسیب شناسی

حسین شباهنگ - استادیار جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

بهرام معمار - استادیار آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

میترا احدی - رزیدنت فوق تخصصی بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

الهام مختاری - رزیدنت فوق تخصصی بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه گلوموس تومور اولیه معده تومور نادری بوده و شیوع به مراتب کمتری نسبت به تومورهای استرومال دستگاه گوارش (GIST) دارند. در مقالات حدود ۱۵۰ مورد گلوموس تومور اولیه معده گزارش شده است. اما تا کنون موردی از آن در نشریات ایرانی منتشر نشده است. معرفی بیمار بیمار مرد ۵۹ ساله با شکایت اصلی احساس پری بعد از غذا از حدود دو سال قبل، مراجعه نموده بود. در اندوسونوگرافی توده ای هیپواکو در عضله مخاطی به ابعاد ۱۴ × ۲۹ میلیمتر را نشان داد. بیمار تحت عمل جراحی رزکسیون گوه ای تومور معده قرار گرفت. در بررسی ریزبینی صفحات و ندولهای یئ از سلولهای یک شکل گرد تا چند وجهی دارای حدود سیتوپلاسمی مشخص با هسته های گرد تا بیضی آرام و سیتوپلاسم روشن محصور در استرومای عروقی منشعب شبه همانژیوپریسیتومی با جدار هیالینیزه دیده شد. مارکرهای ایمونوهیستوشیمی با اکتین اختصاصی عضله، دسمین، کروموگرانین و CD۱۱۷ انجام شد که اولی مثبت و مابقی منفی بود. بدن نتیجه گیری گلوموس تومور اولیه معده اساسا یک تومور خوش خیم بوده لذا افتراق آن از سایر تومورهای بدخیم به منظور جلوگیری از اعمال جراحی رادیکال غیر ضروری الزامی است.

کلمات کلیدی:

گلوموس تومور، معده، گلومانژیوما

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1282418>

