

## عنوان مقاله:

بررسی برخی خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی *Tanacetum fruticosum* Ledeb. در استان هرمزگان

## محل انتشار:

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، دوره 22، شماره 4 (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

## نویسندگان:

محمدامین سلطانی پور - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

رحمان اسدیپور - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

## خلاصه مقاله:

گونه دارویی *Tanacetum fruticosum* Ledeb. از زمانهای قدیم به صورت سنتی در برطرف شدن دل درد، شکم درد و نفخ مصرف می شده است. به منظور شناخت برخی خصوصیات اکولوژیکی این گونه درمنه جهت معرفی به منظور کشت انبوه آن در اراضی زراعی و استفاده در صنایع دارویی و همچنین جلوگیری از تخریب رویشگاههای طبیعی گونه، این بررسی در سال ۱۳۸۲ در استان هرمزگان انجام شد. مشخصات اقلیمی، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، تیپ های اراضی، گیاهان همراه، تیپ رویشگاه و نقشه پراکنش همراه اندازه گیری متغیرهای رویشی، تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک برای گیاه در رویشگاه آن انجام گرفت. این گونه در شیب شمالی کوه باغ چنار و گذارشاه از توابع فارغان شهرستان حاجی آباد در شمال استان، در ارتفاع ۲۴۰۰-۲۰۰۰ متر از سطح دریا پراکنش دارد. اقلیم محل پراکنش گونه خشک بیابانی معتدل است. خاک دارای بافت لومی با  $pH=8.2-8.6$  و  $EC=0.58-1.06$  میلی موس بر سانتیمتر می باشد. تیپ رویشگاه ارس- بادام است و بیش از ۴۰ گونه گیاهی از جمله گونه های توربید، خنجک، بادام تلخ، زیتون، بنه، کلیپوره، تنگرس و گون در محدوده رویشی آن پراکنش دارند. مقایسه میانگین های متغیرهای رویشی اندازه گیری شده بین دو رویشگاه نشان داد که دو منطقه از نظر کلیه متغیرهای اندازه گیری شده تفاوت معنی دار دارند و منطقه گذارشاه از وضعیت مناسبتری نسبت به منطقه باغ چنار برخوردار است.

## کلمات کلیدی:

اکولوژی، *Tanacetum fruticosum*، استان هرمزگان

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1286722>

