

عنوان مقاله:

تأثیر تراکم های مختلف بر عملکرد و میزان اسانس گیاه آویشن باغی *Thymus vulgaris* در زمان گل دهی در استان یزد

محل انتشار:

پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

حسین شمسی محمودآبادی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

عباس زارع زاده - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

زهرا سروی - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

خلاصه مقاله:

به منظور بررسی تأثیر تراکم روی ماده خشک و میزان اسانس آویشن باغی در زمان گل دهی کامل گیاه آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد انجام شد. در این آزمایش میزان اسانس، درصد اسانس و عملکرد ماده خشک در تراکم های مذکور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکم کاشت بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در واحد سطح تأثیر معنی داری ($p \leq 0.01$) دارد. اما تراکم بر روی درصد اسانس تأثیر معنی داری ندارد ولی به سبب افزایش عملکرد ماده خشک باعث افزایش عملکرد اسانس در واحد سطح به طور معنی دار است و مقایسه میانگین نشان داد که بهترین تراکم از نظر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس تراکم 25 است.

کلمات کلیدی:

آویشن باغی، تراکم، عملکرد، میزان اسانس، ماده خشک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/129647>

