

عنوان مقاله:

همه گیرشناسی مصرف دخانیات و ارتباط آن با برخی فاکتورهای دموگرافیک در یک منطقه روستایی کرمان

محل انتشار:

مجله اصول بهداشت روانی، دوره 8، شماره 30 (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

حسن ضیاءالدینی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، بیمارستان شهید بهشتی، گروه روانپزشکی

محمد رضا ضیاءالدینی - پزشک عمومی

خلاصه مقاله:

استعمال دخانیات یکی از علل عمده مرگ زود هنگام در کشورهای توسعه یافته می باشد. به دلیل تغییرات سریع شیوع مصرف سیگار و نیاز به شناخت مشکل، حساس کردن جامعه و دست اندرکاران مسائل بهداشتی، از طرفی مطالعات معدودی که در این زمینه وجود دارد. شیوع مصرف سیگار در یک جمعیت روستایی مورد بررسی قرار گرفت. روش مطالعه: این تحقیق مقطعی در سال ۱۳۸۰ در یک منطقه روستایی با روش نمونه گیری سرشماری انجام شد. اطلاعات از طریق پرسش نامه دموگرافیک به اضافه پرسش نامه فاجراستروم برای وابستگی به نیکوتین که روایی و پایایی آن قابل قبول بود جمع آوری شد. از تمام جمعیت بالای ۱۲ سال خواسته شد که پرسش نامه را تکمیل نمایند. نتایج: از مجموع ۲۱۰۰ پرسش نامه توزیع شده ۱۶۷۰ پرسش نامه قابل تجزیه و تحلیل آماری بود. (میزان پاسخگویی حدود ۸۰٪). ۳۰/۴۹ درصد افراد زن و ۷/۵۰ درصد مرد بودند. در کل نمونه آماری ۵/۱۸ درصد سابقه مصرف سیگار داشته و از این تعداد ۳/۷ درصد وابستگی به سیگار داشتند. در مردان شیوع مصرف سیگار به صورت معنی داری بیشتر از زنان بود ($P < 0.001$). مشوق اصلی در مصرف سیگار در مرحله اول دوستان و در مرحله آخر خواهر یا برادر بوده است. مصرف قلیان و چپق گزارش نشد. متوسط مصرف روزانه ۱۱ نخ سیگار بود. تمایل به ترک سیگار بسیار بالا (۷/۹۰٪) و متوسط اقدام به ترک سه مرتبه بود. نتیجه گیری: سوء مصرف و اعتیاد به سیگار در جمعیت مورد مطالعه در حد قابل توجهی بالاست، به ویژه در مردان با توجه به نقش دوستان و تمایل به ترک بالا به جاست که سازمان های مربوطه نسبت به آموزش جامعه در مورد مهارت های اجتماعی از یک طرف و از طرف دیگر امکانات و تسهیلات در دسترس جهت کسانی که تمایل به ترک دارند اقدام لازم را معمول دارند.

کلمات کلیدی:

شیوع، دخانیات، سیگار، نیکوتین، کرمان، جمعیت روستایی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1307542>

