

عنوان مقاله:

ترکیب گونه ای ماهیان صید شده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)

محل انتشار:

فصلنامه محیط زیست جانوری، دوره 6، شماره 3 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

مهدی مرمضی - گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: ۶۶۹

محمد ذاکری - گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: ۶۶۹

محمدتقی رونق - گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: ۶۶۹

پریتا کوچنین - گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: ۶۶۹

مهسا حق - گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: ۶۶۹

خلاصه مقاله:

این مطالعه با هدف شناسایی فون ماهیان صید شده به وسیله تور و بررسی پراکنش آن ها در رودخانه سزار، یکی از رودخانه های مهم استان لرستان صورت گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از تیر تا آذر ماه ۱۳۹۰ و با استفاده از تورهای پرتابی (سالیکی) با چشمه های مختلف و تور انتظاری با چشمه ۵۰ میلی متری انجام گرفت. در مجموع تعداد ۳۶۶ عدد ماهی صید گردید که شامل ۷ گونه از دو خانواده کپورماهیان و گربه ماهیان بودند. گونه های شناسایی شده در این مطالعه عبارت بودند از: Capoeta:

damascina, Capoeta trutta, Cyprinion macrostomum, Chondrostoma toxostoma, Barbus grypus, Luciobarbus barbulus, Glyptothorax silviae.

در این مطالعه پارامترهای محیطی نیز محاسبه و میزان ارتباط هر یک با فراوانی گونه های شناسایی شده بررسی گردید.

کلمات کلیدی:

رودخانه سزار، استان لرستان، پراکنش ماهیان، کپورماهیان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1313542>

