

عنوان مقاله:

بررسی اجمالی گونه ای گلابی وحشی (*Pyrus syriaca*) از گلسرخیان (*Rosaceae*) در ایران

محل انتشار:

هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسنده:

اصغر زمانی - استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

خلاصه مقاله:

سرده گلابی با ۲۲ تا ۷۵ آرایه شناخته شده در سطح جهان، از اعضای زیرطایفه *Malinae*، زیرتیره *Amygdaloideae* و تیره گلسرخیان (*Rosaceae*) است. این گیاه یکی از عناصر مهم درختی و درختچه ای در پوششهای گیاهی موجود در نواحی گذار هیرکانی و ایرانوتورانی، ناحیه ارسباران و همچنین درختزارهای بلوط زاگرس به شمار می آید. سرده گلابی با ۲۵ آرایه شناخته شده در ایران، از گیاهان ارزشمند اقتصادی دنیا بوده و شناسایی گونه های آن از نظر آرایه شناسی مشکل است. در این مقاله به بررسی اجمالی پراکنش ترین گونه گلابی وحشی در ایران با نام گونه ای *Pyrus syriaca* Boiss. پرداخته میشود. در بین گونه های شناخته شده گلابی در ایران، *P. syriaca* از پیچیدگی بالایی در کلیه صفات ریخت شناسی و ریزریخت شناسی برخوردار است. در این مقاله به مروری بر وضعیت این گونه از منظر ریخت شناسی، پراکنش جغرافیایی، ویژگیهای تشریحی و ریزریخت شناسی پرداخته میشود.

کلمات کلیدی:

گلابی، گلسرخیان، زاگرس، ریخت شناسی، فلور

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1317090>

