

عنوان مقاله:

اثر بخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش ولع مصرف افراد سوء مصرف کننده متآمفتامین

محل انتشار:

فصلنامه روان شناسی کاربردی، دوره 6، شماره 1 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

نسترن منصوریه - دانشگاه آزاد اسلامی

مجید محمود علیلو - دانشگاه تبریز

رضا رستمی - دانشگاه تهران

تورج هاشمی - دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

هدف پژوهش تعیین میزان اثر بخشی تحریک مکرر مغناطیسی در کاهش ولع مصرف افراد سوء مصرف کننده متآمفتامین بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی با خط پایه چندگانه و جامعه آماری ۱۰۰۰ نفر سوء مصرف کننده متآمفتامین مراجعه کننده به درمانگاه ترک اعتیاد آتیه در تهران در زمستان سال ۱۳۸۹ بود. از میان آن ها به روش دسترس ۸ نفر انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه ۲ نفری جایگزین شدند. با بسامد ۱۰ هرتز، ۱۵ جلسه، ۲ نفر تحریک ناحیه پشتی جانبی قشر پیش پیشانی چپ، و ۲ نفر نیز در وضعیت گواه قرار گرفتند. تمام آزمودنی ها در پایان جلسه پانزدهم و یک ماه بعد از دوران درمان در مرحله پیگیری ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از اندازه اثر و درصد کاهش تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری ناحیه قشر پیش پیشانی پشتی جانبی راست، ولع مصرف افراد را به متآمفتامین به طور معناداری کاهش می دهد، اما تحریک ناحیه پشتی جانبی قشر پیش پیشانی چپ چندان موثر نیست. این اثرات یک ماه پس از درمان هم ماندگار بود. نتیجه گیری: می توان از تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری به ویژه ناحیه قشر پیش پیشانی پشتی جانبی راست، به عنوان یک روش درمانی موثر برای کاهش ولع مصرف متآمفتامین در افراد مصرف کننده سود جست.

کلمات کلیدی:

تحریک مکرر مغناطیسی، سوء مصرف کننده، فراقشری، متآمفتامین، ولع مصرف

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1321194>

