

## عنوان مقاله:

اداره خونریزی وسیع در یک سزارین الکتیو با حضور پلاستتا پرکرتا

## محل انتشار:

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 26، شماره 5 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

سید علیرضا موسوی - Mehr Hazrat Abbas Hospital, Mashhad, Mashhad, Iran

پیمان رضاقلی - Dept of Operating Room , Faculty of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

مصطفی صادقی - Mehr Hazrat Abbas Hospital, Mashhad, Mashhad, Iran

## خلاصه مقاله:

بیمار خانم ۳۴ ساله با سابقه سزارین قبلی ۳۴ هفته پلاستتا پروپا و پرکرتا که برای ختم حاملگی به اتاق عمل آورده شد. به دلیل این که جفت پلاستتا پروپا پرکرتا بود ابتدا از دست راست بیمار یک خط وریدی با آنژیوکت خاکستری که یک خط وریدی دیگر با آنژیوکت سبز داشت با سرم رینگر برقرار شد و از دست چپ بیمار نیز یک خط وریدی با آنژیوکت خاکستری با سرم نرمال ساین برقرار شد. بعد از به دنیا آمدن نوزاد جراح از وخیم بودن عمل و احتمال خونریزی وسیع خبر داد. سرویس اورولوژی و جراحی نیز به دلیل دست اندازی جفت به حالب ها و روده ها بر بالین بیمار حاضر شدند. دو کیسه گلوبول قرمز فشرده بر بالین بیمار آماده و آهسته شروع به ترانسفوزیون شد. به صورت ناگهانی بیمار در حین دستکاری جراحی شروع به خونریزی کرد و در مدت ۱۰ دقیقه حجم خونریزی به ۳ لیتر رسید. فوراً برای مریض خون بدون کراس مچ درخواست داده شد. مرتب از ۳ تا خط وریدی مریض فرآورده های خونی تزریق می شد. در پایان عمل مریض با تنفس خود به خود و انتوبه به بخش مراقبت های ویژه فرستاده شد و ۳ ساعت بعد در ICU اکستیوب شد.

## کلمات کلیدی:

Placenta percreta, Pregnancy, Hemorrhage, پلاستتا پرکرتا, حاملگی, خونریزی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1322231>

