

عنوان مقاله:

بررسی ۵ ساله فراوانی و علل توتال آبدو مینال هیستریکتومی در بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرو دشت

محل انتشار:

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 25، شماره 5 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

اکرم دهقانی - *Dept of Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, International Branch, Shiraz, Iran*

فاطمه احمدپور - *Dept of Gynecology, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran*

خلاصه مقاله:

مقدمه: هیستریکتومی شایع ترین جراحی در زنان غیر حامله می باشد. بررسی فراوانی و علل توتال آبدو مینال هیستریکتومی می تواند دیدگاه های جدیدی را در درمان این بیماران برای متخصصین فراهم نماید. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و علل توتال آبدو مینال هیستریکتومی در بیمارستان شهید مطهری مرو دشت انجام شد. مواد و روش ها: این بررسی توصیفی - مقطعی به مدت پنج سال از اول سال ۱۳۸۶ تا اواخر سال ۱۳۹۰ در مرکز آموزشی- درمانی شهید مطهری مرو دشت صورت گرفت. اطلاعات بیمار هیستریکتومی شده با مطالعه پرونده های آنان دریافت شد و در پرسش نامه های از قبل تنظیم شده ثبت شد، سپس داده های گرد آوری شده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: در کل تعداد ۹۱ نفر تحت عمل جراحی هیستریکتومی قرار گرفته بودند. تعداد هیستریکتومی های انجام شده در سال ۱۳۹۰ نسبت به دیگر سال های مورد بررسی بیش تر بود. شایع ترین علل هیستریکتومی به ترتیب خونریزی غیر طبیعی از رحم و افتادگی رحم بود. بیش ترین یافته پاتولوژیک در بیماران مطالعه شده لیومیوما بود. بحث و نتیجه گیری: شایع ترین علت هیستریکتومی در بیماران خونریزی رحم بود. هم چنین با توجه به افزایش ۱۰ برابری تعداد موارد هیستریکتومی، لزوم استفاده از درمان های جایگزین غیر تهاجمی احساس می شود.

کلمات کلیدی:

Hysterectomy, Frequency, Leiomyoma, هیستریکتومی، فراوانی، لیومیوما

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1322344>

