

عنوان مقاله:

مقایسه تاثیر استا مینوفن وریدی با ترکیب شیاف دیکلو فناک و بوپیو اکائین داخل زخم بر درد ۲۴ ساعت اول پس از عمل جراحی سزارین: کار آزمایشی بالینی

محل انتشار:

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 25، شماره 4 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

آرش فربود - Dept of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

سولماز حیدری - General practitioner, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: درد از مهم ترین عوارض پس از زایمان است که شکایت خانم های بار دار را به همراه دارد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی تاثیر استا مینوفن وریدی با ترکیب شیاف دیکلو فناک و بوپیو اکائین داخل زخم بر کنترل درد پس از جراحی سزارین بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کار آزمایشی بالینی سه سو کور بود. تعداد ۱۰۰ بیمار کاندید سزارین به صورت تصادفی به دو گروه A (استا مینوفن وریدی) و B (شیاف دیکلو فناک+ بوپیو اکائین داخل زخم) تقسیم شدند. درد خانم های بار دار در حالت های سکون و حرکت و میزان رضایت مندی آن ها بر اساس معیار NRS و هم چنین میزان آرام بخشی بر اساس معیار ویلسون و در زمان های ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ پس از جراحی، ثبت و مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش: میانگین سن و میانگین وزن دو گروه تفاوت معنا داری با هم نداشت (p value به ترتیب ۱۵/۰ و ۴۱/۰). شدت درد ($p<0.001$) و میزان مورفین مصرفی ($p<0.001$) در گروه B کم تر از گروه A بود و شروع درد در گروه B نسبت به گروه A دیر تر بود ($p<0.001$). بحث و نتیجه گیری: تجویز شیاف دیکلو فناک در ترکیب با بوپیو اکائین موضعی در پایان عمل سزارین باعث درد کم تر و میزان مصرف مورفین کم تر نسبت به استامینوفن وریدی می شود.

کلمات کلیدی:

Intraincisional bupivacaine, Post-operative pain, Cesarean section, بوپیو اکائین داخل

زخم، درد بعد از عمل، سزارین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1322377>

