

عنوان مقاله:

بررسی شیوع و عوامل موثر بر مصرف مواد روان گردان در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز

محل انتشار:

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 21، شماره 4 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

اصغر اشرفی حافظ

محمد رضا فکور زیبا

اکبر بابایی حیدر آبادی

فاطمه حسینی

الهام رزم پوش

ذبیح اله قارلی پور

کامل قبادی داشدبی

رضا ولی زاده

خلاصه مقاله:

مقدمه: به طور معمول مصرف مواد مخدر در میان بزرگسالان از دوران جوانی و حتی نوجوانی نشأت می گیرد. این معضل یکی از آسیب های مهم اجتماعی است به طوری که نه تنها سلامت فرد و جامعه را به خطر می اندازد بلکه موجبات انحطاط روانی و اخلاقی افراد را نیز فراهم می آورد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت و عوامل موثر بر شیوع مواد روان گردان در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ۶۴۰ نفر از دانشجویان بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای از دانشکده های دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه خود ایفا و بدون نام بود. بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش: میزان مصرف مواد روان گردان در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۸/۱۰ درصد و در دانشگاه شیراز ۲/۹ درصد بود، این اختلاف، معنی دار نبود. ($P=0.498$) میزان مصرف مواد روان گردان در مردان بیشتر از زنان بود (۹/۱ درصد در مقابل ۲۵ درصد) و سابقه مصرف در متاهلین بیشتر از مجردین بود. (۵/۱۹ درصد در مقابل ۷/۸ درصد) دانشجویان دانشگاه شیراز در مقایسه با علوم پزشکی شیراز مصرف مشروبات الکلی (۷/۱۷ درصد در مقابل ۴/۹ درصد)، مواد مخدر (۸/۹ درصد در مقابل ۳/۳ درصد) و سیگار (۵/۲۱ درصد در مقابل ۵/۱۷ درصد) بیشتری داشته اند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه ضرورت برنامه ریزی و تدوین راهکارهای مداخله ای پیش گیرانه را در دانشگاه ها در جهت کاهش مصرف مواد در میان دانشجویان و در نتیجه ارتقاء سلامت آن ها را نشان می دهد

کلمات کلیدی:

psychotropic substances, ecstasy, addiction, student
دانشجو، اعتیاد، اکستازی، روان گردان، اکتاسی، اعتیاد،

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1323176>

