

عنوان مقاله:

ارتباط دانش دارویی داروهای ضدانعقاد با تبعیت درمانی بیماران سالمند مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی

محل انتشار:

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 8، شماره 1 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

دانیال هوشیار - *Master of geriatric nursing, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran*

اصغر دالوندی - *Associate Professor, Department of nursing University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran*

مهدی نوروزی - *Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran*

کیان نوروزی - *Associate Professor, Department of nursing University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran*

لیلا سامانی نژاد - *Master of geriatric nursing, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran*

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: در سالمندان، میزان تبعیت از رژیم دارویی به علت کهولت سن و کاهش حافظه، میزان یادآوردن چگونگی دستورات دارویی و مصرف صحیح آنها پایین است که این امر باعث نتایج درمانی ضعیف میشود. هدف این مطالعه تعیین رابطه دانش داروهای ضدانعقاد با تبعیت از رژیم دارویی در بیماران قلبی سالمند مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی میباشد. روش کار: مطالعه مقطعی حاضر در سال ۱۳۹۸ بر روی ۱۱۰ بیمار سالمند ۶۰ تا ۸۹ سال مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی بر اساس تشخیص پزشک بستری در بخش قلب و مراقبت های ویژه قلب بیمارستان توحید سنجید که رضایت به همکاری داشتند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. برای سنجش سطح دانش ضد انعقادها از پرسشنامه تبعیت دارویی ۸ آیتمی موریسکی Morisky Medication Adherence Scale-۸ (MMAS-۸) و پرسشنامه دانش ضدانعقادها AKT استفاده شد. پایایی پرسشنامه دانش ضدانعقادها AKT از روش باز آزمون با تکمیل مجدد توسط ۱۵ بیمار بعد از یک ماه، ضریب همبستگی ۹۹/۴ بدست آمد، که نشان دهنده پایایی پرسشنامه میباشد. برای تایید روایی پرسشنامه دانش ضدانعقادها AKT در اختیار متخصصان قلب و پرستاران قرار گرفت. روایی و پایایی ابزار تبعیت دارویی ۸ آیتم موریسکی در مطالعات قبلی اثبات شده است. یافته ها: میانگین سطح دانش ضدانعقادها در بیماران ۱۷/۸۲±۹/۳۶ بود که سطح متوسط محسوب میشود. میانگین نتیجه تبعیت از درمان در این پژوهش ۶±۱/۵۴ بود که تبعیت از رژیم درمانی متوسط محسوب میشود. بین دانش ضدانعقادها با تبعیت از درمان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (p=۰/۰۲). نتیجه گیری: میانگین نمره دانش بیماران در زمینه داروهای ضد انعقاد در سطح متوسطی بود. تبعیت از رژیم دارویی و دانش در مورد ضد انعقادها در افراد با تحصیلات بالاتر بیشتر بود. بکارگیری برنامه های آموزشی برای سالمندان بصورت ساده و قابل فهم در این زمینه میتواند کمک کننده است.

کلمات کلیدی:

Anticoagulation Knowledge, Medication Adherence, Elderly, Atrial Fibrillation, Heart Disease
دانش، تبعیت رژیم دارویی، سالمندی، فیبریلاسیون دهلیزی، بیماری قلبی

