

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر "الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی" بر افسردگی بیماران همودیالیزی

محل انتشار:

مجله مدیریت ارتقای سلامت، دوره 1، شماره 3 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

صغری افکنند - *Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran*

کیان نوروزی تبریزی - *Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran*

مسعود فلاحی خشکناپ - *Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran*

پوریا رضا سلطانی - *Department of Information Technology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran*

خلاصه مقاله:

مقدمه: همودیالیز در نارسایی مزمن کلیوی، منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن همه ابعاد وجودی بیماران و بروز اختلالاتی چون افسردگی می شود. یکی از روشهای مطلوب نمودن کیفیت مراقبتد واحد همودیالیز، بکارگیری الگوی مراقبتی پرستاری می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر "الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی" بر افسردگی بیماران همودیالیزی انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد است که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بر روی ۳۵ بیمار همودیالیزیاز بیمارستان رازی رشت (آزمون) و ۳۵ بیمار همودیالیزی از بیمارستان شهید بهشتی انزلی (شاهد) در سال ۱۳۹۰ انجام شد. مداخله بر اساس "الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی" با حضور پزشک، پرستار، روانشناس، تغذیه، مددجو و خانواده بصورت تیمی و فراگیرو با در نظر گرفتن ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی هر کدام از مددجویان بطور جداگانه وبمدت سه ماه انجام شد. ابزار گرد آوری شامل پرسشنامه های جمعیت شناسی و سیاهه افسردگی بک "Beck Depression Inventory" بود که قبل و سه ماه بعد از مداخله اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۶ و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی، تی مستقل و آنالیز کوواریانس، کای دو و فیشرمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین افسردگی نمونه های پژوهش قبل (۱۱/۳۰) و بعد از مداخله (۲۰/۲۴) در گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان داد ($P < 0.01$). نتیجه گیری: با اجرای "الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی"، تفاوت معنی داری در امتیاز افسردگی بیماران همودیالیزی ایجاد شد، بطوریکه اجرای این الگوی مراقبتی با بهبود وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی همراه است.

کلمات کلیدی:

Model of psychiatric rehabilitation, Rehabilitation of multi-dimensional, Depression, Hemodialysis, Nursing care
الگوی مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی، افسردگی، همودیالیز، پرستاری، مراقبت.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1357764>



