

عنوان مقاله:

بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

محل انتشار:

مجله دانشکده پزشکی مشهد، دوره 64، شماره 1 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 0

نویسندگان:

وحید سپهر - استادیار، گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

نیوشا مختاری - دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

زهرا شریفی - مربی پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

سید محمد موسوی - استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

الهام صفری - دانشجوی پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

الهه صفری - دانشجوی پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

الناز وفادار مرادی - مربی پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: ویروس هپاتیت سی (HCV) به عنوان عامل مهمی در ایجاد بیماری های مزمن کبدی و کارسینوم سلول های کبدی شناخته شده است. لیکن پلان یکی از تظاهر خارج کبدی عفونت ویروس هپاتیت سی است، هدف از مطالعه ما بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی و بیماری لیکن پلان می باشد. روش کار: این مطالعه مورد شاهی بر روی ۱۰۶ بیمار مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان ۲۲ بهمن در فاصله زمانی سال ۹۶ تا ۹۷ انجام شده است. گروه بیمار شامل ۵۳ بیمار مبتلا به لیکن پلان و گروه شاهد شامل ۵۳ بیمار فاقد لیکن پلان که به مقاصد زیبایی مراجعه کرده بودند، می باشد. پس از اخذ رضایت آگاهانه، در هر دو گروه مورد و شاهد آزمایش آنتی ویروس هپاتیت C انجام گرفت. در موارد مثبت، جهت تایید عفونت، آزمایش واکنش زنجیره پلی مرز ویروس هپاتیت سی (HCV.PCR) انجام شد. اطلاعات بیماران از طریق چک لیست جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS۲۴ آنالیز گردید. نتایج: در این مطالعه ۵۵ نفر زن (۵۱.۹٪) و ۵۱ نفر مرد (۴۸.۱٪) بودند و میانگین سنی $2/31 \pm 8/7$ سال بود. در ۵۳ بیمار مبتلا به لیکن پلان ۱ نفر (۱.۹٪) و در گروه شاهد ۳ نفر (۵.۷٪) از نظر ویروس هپاتیت سی مثبت بودند. تفاوت معناداری بین دو گروه مورد و شاهد در عفونت هپاتیت سی وجود نداشت ($P=618/0$). نتیجه گیری: با توجه به اینکه تفاوت معناداری بین گروه شاهد و مورد مشاهده نشد؛ بنابراین بررسی روتین آنتی بادی هپاتیت سی (C) در همه ی بیماران لیکن پلان ضروری نمی باشد.

کلمات کلیدی:

عفونت، لیکن پلان، هپاتیت سی (C)

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1368384>



