

عنوان مقاله:

تاثیر اجرای الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی و پیشگیری از عوارض بعد از عمل در بیماران جراحی پیوند عروق کرونر

محل انتشار:

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 1، شماره 2 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

زرافشان حقدوست - University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran

کیان نوروزی - University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran

محمدعلی حسینی - University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: با افزایش روزافزون جراحی های بای پس عروق کرونر در جامعه، اهمیت عوارض بعد از عمل جراحی و کیفیت زندگی در این بیماران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی و پیشگیری از عوارض بعد از عمل جراحی در بیماران بای پس عروق کرونر انجام شد. روش: مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی بر روی ۷۰ بیمار با عمل جراحی پیوند عروق کاروانی انجام شد. نمونه ها به روش غیر احتمالی مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. در گروه مداخله الگوی مراقبت پیگیر به مدت دو ماه اجرا و در گروه کنترل مراقبت های روتین بخش انجام گرفت. از پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی اختصاصی مک نیو در سه مرحله قبل، یک و دو ماه بعد از عمل جراحی و چک لیست عوارض بعد از عمل یک ماه و دو ماه بعد از جراحی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر، آزمون تی مستقل و تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اجرای مدل مراقبت پیگیر تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات کیفیت زندگی و عوارض بعد از عمل نمونه های پژوهش گروه مداخله و شاهد ایجاد کرد ($p=0.01$). میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی در گروه مداخله قبل از عمل، یک و دو ماه بعد از عمل جراحی به ترتیب $4/150 \pm 1/12$ ، $3/189 \pm 1/16$ و $5/180$ بود. همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی در گروه شاهد قبل از عمل، یک و دو ماه بعد از عمل جراحی به ترتیب $7/24 \pm$ و $2/139$ ، $3/21 \pm 5/166$ و $4/10 \pm 2/168$ بود. علاوه بر این درصد عوارض بعد از عمل در گروه مداخله یک ماه بعد 40% و در گروه شاهد 85% بوده که این تفاوت نیز به لحاظ بالینی و آماری معنی دار بود ($p<0.01$). نتیجه گیری: اجرای مدل مراقبت پیگیر روی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر، موجب بهبود کیفیت زندگی و کاهش بروز عوارض بعد از عمل جراحی می شود.

کلمات کلیدی:

continuous care model, quality of life, post-operative complications, Coronary artery bypasses grafting
مدل مراقبت پیگیر، کیفیت زندگی، عوارض بعد از عمل، پیوند عروق کرونر.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1396732>

