

عنوان مقاله:

شیوع اختلال استرس پس از تروما (PTSD) بدنبال اپیدمی COVID-۱۹ در کارکنان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

محل انتشار:

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، دوره 29، شماره 4 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

حسین ابراهیمی - Associate Professor of Nursing, Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

سید محمد میرحسینی - Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

محمد حسن بصیری نژاد - Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

اسماعیل شریعتی - Imam Hossein Center for Education, Research and Treatment, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: با توجه به روند رو به رشد شیوع COVID-۱۹ در دنیا و افزایش بار کاری ارائه دهندگان خدمات سلامت، کارکنان سلامت با مشکلات متعددی مانند ساعات کاری طولانی، دوری از خانواده، نگرانی از ابتلاء خود و خانواده مواجه هستند که می تواند سلامت آن ها و در نتیجه عملکرد شغلی شان را با چالش مواجه کند. این تحقیق با هدف بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) به دنبال اپیدمی COVID-۱۹ در کارکنان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۲۲۸ نفر از کارکنان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در بازه زمانی شهریور الی آذرماه ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفتند. مشارکت کنندگان شامل، پرسنل پرستاری، پزشکی، رادیولوژی و آزمایشگاه بودند. پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست علائم استرس پس از سانحه PCL-C به صورت آنلاین تکمیل شد. جهت آنالیز داده ها، از شاخص های آمار توصیفی و مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، ۸۵/۵ درصد افراد استرس پس از سانحه را تجربه می کردند. ضریب تعیین رگرسیونی (R²) به میزان ۱۵/۱ تعیین شد، به طوری که مردان به نسبت زنان، ۴/۸۸ واحد استرس پس از سانحه پایین تری تجربه می کردند. افرادی که نزدیکان شان بر اثر ابتلا به COVID-۱۹ فوت کرده بودند نسبت به سایرین، ۷/۰۴ واحد استرس پس از سانحه بالاتری را تجربه می کردند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کارکنان سلامت استرس پس از سانحه را تجربه کردند، لازم است تا مدیران ارشد مراکز درمان، اقدامات حمایتی بیش تری جهت کاهش استرس پس از سانحه در برنامه کاری خود قرار دهند.

کلمات کلیدی:

COVID-۱۹, Health Worker, Post Traumatic Stress Disorder, اختلال استرس

پس از سانحه، کارکنان سلامت، بیماری کووید-۱۹

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1401934>



