

عنوان مقاله:

بررسی قطر و وزن میوه Pistacia atlantica در چند منطقه شرقی کشور

محل انتشار:

یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

حمیدرضا آسا - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع، دانشگاه بیرجند

شعله قلاسی مود - استاد گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

مسلم رستم پور - استاد گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:

در گستره ی جغرافیای طبیعی ایران هنگامی که سخن از مناطق خشک و نیمه خشک باشد قطعا نیمه ی شرقی و جنوب شرقی کشور در ذهن پژوهشگر تداعی پیدا می کند. در این منطقه گیاهان دارویی و صنعتی اهمیت ویژه ای دارند که از جمله ی این گیاهان بنه می باشد. این گونه دارای محصولات اصلی و فرعی با ارزشی بوده. پسته وحشی (Pistacia atlantica) که بنه خوانده می شود پس از جنس بلوط (Quercus) بیشترین سطح جنگل ها در منطقه رویشی زاگرس را به خود اختصاص داده است و به عنوان یک گونه اقتصادی مهم برای مردم روستایی در جنگل های این ناحیه وجود دارد. همه مسائل گفته شده از قبیل تخریب و کاهش چشمگیر و سراسری رویشگاههای بنه و خصوصا عدم انجام تحقیقات کافی در مناطق شرقی کشور در خصوص بنه ، اهمیت بررسی و مطالعه این درخت با ارزش را دوچندان می کند. ۳ منطقه از استانهای شرقی کشور جهت جمع آوری نمونه انتخاب گردید از هر منطقه سه تکرار مورد آزمایش و اندازه گیری قرار گرفت ، همچنین طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام، در نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل ، و جداول به کمک نرم افزار Excel رسم گردید. تمامی نمونه ها جهت اندازه گیری صفات مورفولوژیکی به آزمایشگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند منتقل گردید و اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق بیان داشت که صفات قطر میوه و نسبت پوست به میوه در سطح ۵ درصد معنی دار گردید و بدان معناست که اختلاف معنی داری در مناطق مورد مطالعه در صفت های یاد شده وجود دارد و اما در صفت وزن میوه اختلاف معنی داری در مناطق مورد مطالعه دیده نشد.

کلمات کلیدی:

بنه ، صفات مورفولوژیکی ، تنوع گیاهی ، شرق کشور

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1413065>

