

عنوان مقاله:

بررسی تغییرات فشار خون شریانی در بیماران بالغی که با القاء بیهوشی عمومی تحت عمل جراحی قرار می گیرند

محل انتشار:

مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره 8، شماره 2 (سال: 1380)

تعداد صفحات اصل مقاله: 0

نویسندگان:

اصغر حیدری
ولی الله حسنی

خلاصه مقاله:

هدف از این پژوهش تعیین تغییرات فشار خون شریانی در بیماران بالغی که با القاء بیهوشی عمومی در یکی از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عمل جراحی قرار می گیرند ن بود. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقایسه ای سات که در سال ۱۳۷۰ در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است. در این پژوهش فشار خون شریانی ۴۰ نفر از بیماران بوسیله فشارسنج جیوه ای و گوشی پزشکی و مشاهده مستقیم در مراحل مورد نظر ثبت و ضبط گردید و داده های مورد نظر با آزمون t زوج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از آن بوده اند که میانگین اختلافات فشار خون سیستولیک بیماران مورد پژوهش در مرحله قبل از القاء بیهوشی ۱۰، ۶۲/۱۸ و بلافاصله بعد از عمل و خارج نمودن لوله تراشه ۱۱ می باشد. همچنین میانگین اختلافات فشار خون دیاستولیک بیماران مورد نظر در همین مراحل در مقایسه با فشار خون آنان در بخش در مراحل فوق به ترتیب ۲۵/۳، ۸۷/۵، ۸۷/۸، ۶۲/۶ است که آزمون آماری معنی دار بودن این اختلافات را نشان می دهد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های کسب شده نشان دهنده وجود تغییرات فشار خون بیماران در کلیه مراحل قبل و بعد از القاء بیهوشی، حین عمل و بیهوشی بلافاصله بعد از عمل و خارج نمودن لوله تراشه می باشد.

کلمات کلیدی:

Anesthesia, General / Blood Pressure / Surgery, بیهوشی عمومی / جراحی / فشار خون

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1437131>

