

## عنوان مقاله:

گزارش دو مورد انتقال خون اتولوگ در اعمال جراحی الکتیو

## محل انتشار:

مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره 7، شماره 1 (سال: 1379)

تعداد صفحات اصل مقاله: 0

## نویسندگان:

علیرضا منصف  
سید کمال موسوی

## خلاصه مقاله:

PABD یکی از روشهای Autologous blood transfusion است که طی آن از خون بیمار که قبل از عمل جراحی با رعایت فاصله زمانی مناسب دریافت شده، جهت جبران خون از دست رفته بیمار در طی عمل جراحی استفاده می شود. از مزایای بسیار مهم این روش پیشگیری از انتقال عفونت‌های مختلف منتقله از طریق خون و فرآورده های خونی و پیشگیری از واکنش‌های ازدیاد حساسیت به آنتی ژن‌های HLA تایپ است. داوطلبین انجام PABD از میان بیماران ارتوپدی، جراحی قلب، کودکان، افراد مسن، زنان باردار و بیماران الکتیو جراحی‌های پلاستیک می باشند. مقاله حاضر گزارش ۲ مورد از بیماران داوطلب جراحی پلاستیک در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد که روش PABD برای اعمال جراحی Abdominoplasty و Mammoplasty و Reduction برای آنان انجام بروی بیمارستان را ترک کردند. این عمل جراحی با حال عمومی خوب بیمارستان را ترک کردند.

## کلمات کلیدی:

Blood Transfusion/ Blood Transfusion, Autologous/ Surgery, Elective, انتقال خون / انتقال خون از خود به خود / جراحی الکتیو

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1437188>

