

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر تغذیه با شیر مادر در کاهش ابتلا به اوتیت حاد میانی در شیرخواران زیر دو سال شهر همدان در سال ۱۳۷۵

محل انتشار:

مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره 6، شماره 4 (سال: 1378)

تعداد صفحات اصل مقاله: 0

نویسندگان:

پریسا پارسا

محمدصادق صبا

خلاصه مقاله:

به منظور تعیین تاثیر تغذیه با شیر مادر در کاهش ابتلا به اوتیت حاد میانی، یک مطالعه گذشته نگر مورد شاهدی طرح ریزی شد. ۲۰۰ شیرخوار سالم در گروه شاهد و ۱۰۰ شیرخوار مبتلا به اوتیت حاد میانی در گروه مورد که سن زیر ۲ سال داشتند، بر اساس نوع تغذیه و سایر عوامل موثر بر این بیماری از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه آبانماه ۱۳۷۵ در شهر همدان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغذیه انحصاری با شیر مادر، شروع زودتر تغذیه با شیر مادر، فواصل کوتاه شیردهی مادر در شبانه روز، طولانی بودن مدت تغذیه با شیر مادر، هم اتاقی مادر و نوزاد بعد از تولد و تغذیه با آغوز ارتباط معنی داری با کاهش خطر ابتلا به اوتیت حاد میانی دارند ($P < 0.001$). در حالیکه تغذیه با شیشه، تغذیه در حالت خوابیده، آلرژی کودک، مراقبت در مهد کودک، افزایش سن کودک و سابقه ابتلا به اوتیت مکرر میانی ارتباط معنی داری با افزایش خطر ابتلا به اوتیت حاد میانی دارند ($P < 0.001$). عواملی چون جنس شیرخوار، رتبه تولد شیرخوار، سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده، سواد خانواده، سن والدین و مراعات انضباط در انجام واکسیناسیون ارتباط معنی داری با ابتلا به اوتیت حاد میانی نشان نمی دهند ($P > 0.05$). نتیجه نهائی اینکه تغذیه با شیرمادر اهمیت ب سزایی در پیشگیری و کاهش خطر ابتلا به اوتیت حاد میانی شیرخواران دارد.

کلمات کلیدی:

Breast Feeding / Infant / Otitis Media، التهاب گوش میانی / تغذیه با شیر مادر / شیرخوار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1437196>

