

عنوان مقاله:

نقش درمان زخم با فشار منفی در زخم های ناشی از جنگ

محل انتشار:

فصلنامه ابن سینا، دوره 14، شماره 1 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

علی اصغر سعیدی

محمد امینیان فر

محمد درویشی

سیروس فرجی

خلاصه مقاله:

آسیب های جنگی اکثرا زخم های حاصله از حوادث پیر انرژی است. در جنگ مدرن اکثر آسیب ها به سیستم عضلانی اسکلتی وارد می شود و جراحی ارتوپدی نظامی نقش کلیدی و خط اول در این آسیب ها دارد. اکثر آسیب ها ناشی از حوادث انفجاری (۵۵%) و تقریبا ۲۰% ناشی از زخم های گلوله می باشند. افزایش تعداد آسیب های اندام ها ضرورت تکنولوژی های جدید در مراقبت از زخم های جنگی کمپلکس را ایجاد کرده است. در تخلیه ی مجروحین از مسافت های طولانی که در جنگ های اخیر مشاهده شده است، لزوم فرم های جایگزین مراقبت های زخم بیشتر آشکار گردیده است. گاه لازم می گردد بدلیل ترشحات فراوان زخم، پانسمان روزانه دو بار تعویض گردد. بنابراین در اوایل سال ۲۰۰۵ درمان زخم با فشار منفی (Negative Pressure Wound Therapy) NPWT برای پانسمان زخم های جنگی کمپلکس بکار گرفته شد. به هر حال استفاده از NPWT برای زخم های جنگی کمپلکس در بیمارستان های ترومایی منطقه ی جنگی و یا در هواپیماهای ویژه ی حمل مجروحین جنگی یک روش جدید بکار گرفته شده است؛ با این وجود هنوز به عنوان دکنترین درمان بیماران جنگی در نیامده است.

کلمات کلیدی:

Negative pressure wound therapy, war wounds, Aeromedical evacuation, درمان زخم با فشار

منفی (NPWT)، زخم های جنگی کمپلکس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1438329>

