

عنوان مقاله:

میزان محدودیت مصرف دخانیات در منزل در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن

محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 11، شماره 4 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

اعظم بحیرایی

شرمین فقیهی راد

ماندانا میرمحمدعلی

انوشیروان کاظم نژاد

خلاصه مقاله:

محدودیت مصرف دخانیات در منزل می تواند منجر به کاهش میزان مواجهه با دود آن شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان محدودیت مصرف دخانیات در منزل و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار بود. این پژوهش از نوع مقطعی بوده که در شهر تهران، طی سال های ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه، ۱۲۳۲ نفر از زنان باردار بودند که به بیمارستان ها و درمانگاه های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمودند. روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت طبقه ای خوشه ای تصادفی و ابزار مطالعه پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید. عوامل مرتبط با محدودیت مصرف سیگار در منزل با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه بررسی شد. محدودیت کامل مصرف دخانیات فقط توسط ۵/۳۱ درصد از خانواده ها در منزل رعایت می شد. نتایج آزمون یادشده محدودیت مصرف دخانیات در منزل با متغیرهای وجود فرد مصرف کننده دخانیات در اعضای خانواده (OR=۱/۹۶، CI: ۱/۵۰-۲/۵۶)، اعتقاد زنان باردار در مورد تاثیر مواجهه با دود سیگار (OR=۱/۹۵، CI: ۰/۳۳-۰/۶۳)، اعتقاد زنان باردار در مورد تاثیر مواجهه با دود دخانیات بر سلامت جنین ارتباط آماری معنی داری داشتند. بر اساس نتایج این مطالعه بسیاری از زنان باردار در منزل در معرض دود دخانیات قرار می-گیرند. وجود فرد مصرف کننده دخانیات در اعضای خانواده و اعتقادات زنان باردار در مورد تاثیر مواجهه با دود دخانیات بر سلامت جنین از عوامل مهم مرتبط با محدودیت مصرف سیگار در منزل هستند.

کلمات کلیدی:

Pregnancy, Smoking ban, Exposure to tobacco smoke, دوران بارداری،

محدودیت مصرف دخانیات، مواجهه با دود دخانیات

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1440313>

