

عنوان مقاله:

پیش بینی الگوهای ارتباطی بر اساس ترس از ویروس کووید-۱۹ در بیماران کلیوی بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم آباد

محل انتشار:

ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

هادی فراست - دانشجوی دکترای مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

مهین میرزایی - کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه پیام نور اصفهان

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: هدف تحقیق پیش بینی الگوهای ارتباطی بر اساس ترس از ویروس کووید-۱۹ در بیماران کلیوی بود. مواد و روش ها : جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بیماران بستری شده در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بود. که تعداد ۳۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ، پرسشنامه های اضطراب کرونا علیپور و همکاران ۱۳۹۸ و پرسشنامه الگوهای ارتباطی ریچی و فیتزپاتریک (۱۹۹۰) ، مبتنی بر آنلاین بود. . بود تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی فراوانی درصد و استنباطی آزمون نرمال کالموگراف - اسمیرنوف ، ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون انجام گرفت یافته ها: نتایج نشان داد که بین ترس از کووید-۱۹ با جهت گیری همنوایی $r = -0.318$ ؛ $sig = 0.002$ ؛ بین ترس از کووید-۱۹ با جهت گیری گفت و شنود $r = -0.214$ ؛ $sig = 0.043$ و بین ترس از کووید-۱۹ الگوهای ارتباطی $r = 0.318-0.288$ ؛ $sig = 0.006$ ؛ در سطح 0.05 درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد نتایج تحلیلی رگرسیون نیز نشان داد که ترس از کووید-۱۹ تاثیر معناداری بر الگوهای ارتباطی دارد و 0.08 درصد از واریانس مشترک الگوهای ارتباطی بیماران کلیوی را پیش بینی می کند. بحث و نتیجه گیری : نتیجه گیری اینکه افزایش ترس از ویروس کووید-۱۹ ، الگوهای ارتباطی جهت گیری همنوایی و جهت گیری گفت و شنود در بیماران کلیوی راکاهش می دهد.

کلمات کلیدی:

الگوهای ارتباطی ، بیماران کلیوی ، ترس از ویروس کووید-۱۹ ، خرم آباد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1442773>

