

## عنوان مقاله:

وضعیت آلودگی به هپاتیت B (HBV) در زندان های کشور و رابطه آن با اعتیاد طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۰

## محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 7، شماره 3 (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

کاظم محمد  
فرشته عسگری  
محمد مهدی گویا  
اکبر فتوحی  
ابوالقاسم یوسفی

## خلاصه مقاله:

هپاتیت، شایع ترین بیماری کبدی است و در اثر ویروس ها، داروها و برخی عوامل دیگر ایجاد می شود. هپاتیت B یکی از انواع هپاتیت های ویروسی منتقله از راه خون است. یکی از مهم ترین عوامل خطر آلودگی به HBV اعتیاد تزریقی است، لذا بررسی وضعیت آلودگی به این بیماری در زندان ها اهمیت خاصی دارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی به HBV در زندان های کشور انجام شده است. این مطالعه مقطعی (Cross sectional) به بررسی نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در زندان های ۷ استان بر روی ۵۳۱۷ نمونه خون از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴، در زمینه آلودگی به هپاتیت B می پردازد. آلودگی به HBV در زندان های کشور، از ۱ درصد تا ۱۵ درصد متغیر بوده و در مجموع زندان های بررسی شده شیوع آلودگی به HBV، شش ممیز هفت دهم درصد ( $CI = 95\% = 4/7\% - 1/6\%$ ) بود. در بررسی سن، ارتباط معنی داری بین افزایش میزان شیوع با بالا رفتن سن در زندان های مختلف مشاهده نشد ( $P = 88/0$ ). با توجه به در دست بودن اطلاعات اعتیاد تزریقی در زندان های سبزوار (سال ۱۳۸۴) و بیرجند (سال ۱۳۸۳) مشاهده شد که شیوع HBV در معتادان تزریقی به طور معنی داری بیش از سایر زندانیان است (به ترتیب  $P = 0/3$  و  $P = 0/0003$ ). در مجموع شیوع ابتلا به HBV در زندانیان کشور به طور قابل ملاحظه ای از جمعیت عادی بیشتر است. بیماریابی های منظم و اقدامات پیشگیرانه مانند واکسیناسیون HBV، رعایت موارد احتیاطی و سهولت دسترسی این جمعیت پرخطر به امکانات درمانی قویا توصیه می شود.

## کلمات کلیدی:

Prison, HBV, Injective drug abusing, زندان, HBV, اعتیاد تزریقی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1443726>

