

عنوان مقاله:

تأثیر مغناطیس درمانی موضعی بر میزان درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی (سال: ۱۴۰۰)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۱۰

نویسندگان:

آرمین ناظری - دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

علی محمدپور - استاد، دکتری آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

مجتبی کیان مهر - استاد، دکتری تخصصی بیوفیزیک، عضو هیئت علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

محمد هادی سعید مدقق - استاد، فوق تخصص جراحی عروق، مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: دیابت نوع ۲ شایع ترین نوع دیابت و اختلالی شایع است که تعداد مبتلایان به آن در سرتاسر جهان رو به افزایش است. نوروپاتی دیابتی دردناک از شایع ترین عوارض دیابت است که با افزایش ناتوانی و مرگ و میر همراه است. مغناطیس درمانی یکی از روش های طب مکمل است که استفاده از آن در درمان و مدیریت درد نوروپاتی دیابتی مورد بحث است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مغناطیس درمانی بر میزان درد نوروپاتی دیابتی انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی (IRCT۲۰۲۱۰۳۱۵۰۶) دوسو کور، ۳۸ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهر مشهد در سال ۱۴۰۰ که از درد نوروپاتی شکایت داشتند، با روش بلوک جایگزینی بصورت تصادفی به دو گروه مداخله (۱۹ نفر) و کنترل (۱۹ نفر) تخصیص یافتند. در گروه مداخله از مچ بند های مغناطیسی ۱۵۵ میلی تسلا و در گروه کنترل از مچ بند های غیرمغناطیسی به مدت ۴ هفته مداوم در ناحیه مچ پای مبتلا استفاده شد. میزان درد با مقیاس بصری درد سنجیده و قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ و توسط آزمون های آماری توصیفی و استنباطی با لحاظ سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ تحلیل شد. یافته ها: میانگین سن در بیماران تحت مطالعه ۷۱ / ۵۹ سال و ۴ / ۶۸ درصد بیماران جنسیت مونث داشتند. میانگین نمره درد نوروپاتی در دو گروه، قبل از مداخله با هم اختلاف معناداری نداشت ($P = 0/39$) اما پس از مداخله از نظر درد نوروپاتی فقط در گروه مداخله اختلاف معناداری مشاهده شد ($P = 0/001$). نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر استفاده از مغناطیس درمانی باعث کاهش درد نوروپاتی دیابتی می شود. لذا ضمن پیشنهاد مطالعات تکمیلی استفاده از این روش در کنار سایر درمان ها توصیه می شود.

کلمات کلیدی:

مغناطیس درمانی، نوروپاتی محیطی، نوروپاتی محیطی دردناک، درد، دیابت نوع ۲

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1443784>

