

عنوان مقاله:

واکسیناسیون کووید ۱۹ برای بیماران مبتلا به سرطان

محل انتشار:

دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

صدیقه زمانی - دانشجوی پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

شکوفه زمانی - دانشجوی پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

محدثه زمانیان - دانشجوی پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

فریدخت یزدانی - مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

خلاصه مقاله:

زمینه: انجام اقدامات احتیاطی جهانی و واکسیناسیون تنها راهبردهای پیشگیرانه در همه گیری کووید-۱۹ است. بیماران مبتلا به سرطان در حال حاضر در وضعیت متفاوتی از به خطر افتادن ایمنی، به دلیل سرطان یا درمان و عوارض آن هستند. در بیماران مبتلا به سرطان خطر عوارض و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ بیشتر است و به عنوان یک زیرگروه با اولویت بالا برای واکسیناسیون کووید ۱۹- در نظر گرفته می شوند. اهداف: هدف از این مطالعه توصیف واکسیناسیون کووید ۱۹- در بیماران مبتلا به سرطان بود. روش: مقاله مروری با جستجو در پایگاه های PubMed، Google Scholar و web of science با استفاده از کلیدواژه های "FDQFHU""۹DFFLQH" تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ انجام شد. یافته ها: داده های مربوط به ایمنی، تحملپذیری و کارایی واکسنهای کووید-۱۹ در بیماران مبتلا به سرطان محدود است. اطلاعات واقعی و مبتنی بر شواهد می تواند از بهترین شیوه ها در مراقبت بالینی انکولوژی حمایت کند. نتیجه گیری: با این که، تا به امروز هیچ داده ای برای اثبات ایمنی و اثربخشی واکسن در بیماران مبتلا به سرطان وجود ندارد اما واکسیناسیون کووید-۱۹، در صورت مجاز یا تایید، به عنوان یک استاندارد مراقبت برای بیماران مبتلا به سرطان در نظر گرفته می شود. علیرغم فقدان شواهد با کیفیت بالا، اما با فرض اینکه فواید آن بیشتر از خطر است، متخصصان جوامع مختلف به طور هماهنگ واکسیناسیون را برای بیماران مبتلا به سرطان فعال یا نجات یافتگان از آن توصیه میکنند. استثنا از واکسیناسیون برای بیمارانی است که تحت پیوند یا سلول درمانی و درمان های بسیار سرکوب کننده سیستم ایمنی قرار می گیرند، و ایمن سازی برای آنها باید حداقل ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اثربخشی واکسن به حداکثر برسد.

کلمات کلیدی:

بیمار سرطانی، واکسن کووید-۱۹

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1446889>



