

عنوان مقاله:

عوامل موثر بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به نئوپلازی های لنفاوی (لوسمی و لنفوم)

محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 5، شماره 2 (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

آریتا خیلناش

علی منتظری

بهروز نبئی

خلاصه مقاله:

هدف از درمان بیماری های مزمن و از جمله بدخیمی های خونی، افزایش طول عمر بیماران و بهبود بخشیدن توانایی های آنان تا حد ممکن است تا بیماران بتوانند با حفظ سطح مناسبی از کیفیت زندگی به زندگی خود ادامه دهند. این در حالی است که غالباً مطالعاتی که در زمینه ارزیابی درمان های مختلف بیماری انجام می گیرد، بیشتر بر روی افزایش طول عمر بیماران بدون توجه به کیفیت زندگی و مسائل جانبی درمان متمرکز می باشد. لنفوم و لوسمی از نئوپلازی های سیستم لنفاوی هستند که بر اساس مرحله بیماری در زمان تشخیص و نوع سلول های بدخیم از نظر پاتولوژی، در زمان کوتاه یا طولانی منجر به ناتوانی یا مرگ بیمار می شوند. در این مقاله بر آنیم که کیفیت زندگی این بیماران را بررسی کنیم. به این منظور در یک مطالعه مقطعی تعداد ۹۴ بیمار را که ۶ ماه یا بیشتر از تشخیص بیماریشان می گذشت و جهت مراقبت و درمان به درمانگاه خون بیمارستان امام خمینی مراجعه می کردند، مورد بررسی قرار دادیم. پرسشنامه SF-۳۶ و اطلاعات دموگرافیک در مورد بیماران تکمیل شد. در نهایت با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره لجستیک داده ها تفسیر گردید. در آنالیز رگرسیونی چند متغیره رو به عقب (Backward)، تنها متغیرهایی که با نمره کلی جسمانی (PCS) (خلاصه امتیاز ابعاد جسمانی) ارتباط معنی داری داشتند، عبارت بودند از: نوع بیماری (OR=۳۲/۱۶ و CI%۹۵ = ۰۳/۴-۷۲/۵۵)، تحصیلات (OR=۰۱/۰-۷۴۹/۰ = ۰۹۵% CI = ۸۸/۰ و OR=۲۵/۱۰ و CI%۹۵ = ۶۵/۲-۶/۳۹) و جنسیت (OR=۱۳/۰ و CI%۹۵ = ۶۹/۱-۸۲/۱۴). نتایج این مطالعه نشان می دهد که امتیاز بالاتر در حیطه کیفیت زندگی از نظر جسمانی، با ماهیت غیر تهاجمی بیماری، مرد بودن و تحصیلات کمتر و امتیاز بالاتر در حیطه کیفیت زندگی از نظر روانی، با ماهیت غیر تهاجمی بیماری، مرد بودن و درآمد بیشتر همراه است.

کلمات کلیدی:

Health-related quality of life, Leukemia, Lymphoma, Prognostic factors, لوسمی, لنفوم, کیفیت زندگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1447992>

