

عنوان مقاله:

فراوانی موارد HBsAg مثبت در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر اهواز

محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 3، شماره 3 (سال: 1383)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

راضیه محمد جعفری

نسرین سعادت

شهلا وزیری اسفرجانی

اشرف سورانی یان چشمه

خلاصه مقاله:

عفونت با ویروس هپاتیت B یک مشکل مهم بهداشتی در تمام نقاط دنیا بشمار می رود و ارتباط آن با طب زنان و زایمان، بعلت خطر بالای انتقال عمودی عفونت از مادر به جنین یا نوزاد، احتمالا بالای مزمن شدن بیماری در نوزادان و امکان بالقوه پیشگیری از عفونت در نوزاد از طریق بکارگیری ایمونوگلوبولین و واکسن هپاتیت B می باشد. شایعترین علت زردی در بارداری هپاتیت ویروسی است. مطالعات نشان داده اند که احتمال زایمان پره ترم بدنال هپاتیت حاد در سه ماه سوم افزایش می یابد و همچنین بدنال این بیماری در ۹۰٪ شیرخوارانی که در دوره پره ناتال آلوده شده اند، ۵۰٪ کودکان و نیز ۱۰٪ بالغین، حالت ناقل مزمن ایجاد می شود. بر این اساس پژوهش حاضر بصورت یک مطالعه مقطعی-تحلیلی جهت تعیین فراوانی موارد HBsAg به روش تصادفی ساده بر روی ۱۲۰ خانم باردار که از تاریخ فروردین ماه سال ۱۳۷۷ لغایت دی ماه سال ۱۳۷۷ به مراکز بهداشتی-درمانی شهر اهواز مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه، تکمیل پرسشنامه و بررسی پاسخ آزمایشات بوده است. نتایج مطالعه نشان داد که ۲ نفر از ۱۲۰ نمونه مورد مطالعه HBsAg مثبت بودند (۱.۷٪) و HBeAg در هیچکدام از این دو مورد یافت نشد. هپاتیت ویروسی یکی از ۵ عامل عفونی مرگ زودرس انسانی در سطح جهان می باشد. این یافته ها و نیز مطالعات انجام شده در زمینه شیوع بالای ناقلین مزمن هپاتیت B و نیز انتقال عفونت از مادر ناقل به نوزاد، نیاز به انجام غربالگری رایج در تمام زنان باردار از نظر HBsAg را مورد حمایت قرار می دهد.

کلمات کلیدی:

HBsAg (Hepatitis B Antigen), HBeAg, Pregnant women, Ahwaz, HBsAg, بارداری, اهواز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1448198>

