

## عنوان مقاله:

میزان شیوع و عوامل موثر در بروز سروما در جراحی های سرطان پستان

## محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 2، شماره 3 (سال: 1382)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

عصمت السادات هاشمی

علی منتظری

احمد کاویانی

معصومه نجفی

ماندانا ابراهیمی

## خلاصه مقاله:

سرطان پستان شایعترین سرطان بانوان است و جراحی، مهمترین نقش را در درمان این بیماران ایفا میکند. سروما یکی از شایعترین عوارض پس از جراحی سرطان پستان است. این مطالعه یک بررسی توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف برآورد نسبی از میزان بروز سروما و عوامل موثر بر بروز آن در این بیماران انجام پذیرفته است. اطلاعات به دست آمده از ۱۳۵ بیمار مبتلا به سرطان پستان، از مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی و بیمارستان امام خمینی در پرسشنامه ای جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که میزان بروز سروما در این بیماران ۳۹٪ بوده و این میزان به طور معنی داری در بیماران با آسیب شناسی نوع داکتال نسبت به غیر داکتال بیشتر بوده است ( $P=0.01$  و Odds ratio: ۱۷.۷). همچنین این مطالعه نشان می دهد که بروز سروما رابطه ای با مرحله بیماری، سن بیماران، بانداژ محل عمل، شیمی درمانی قبل از عمل، زمان خروج درن ها، نوع عمل جراحی و ... ندارد و نوع آسیب شناسی یک عامل مستقل برای بروز سروما است.

## کلمات کلیدی:

Breast cancer, Surgical complications, Seroma, سرطان پستان, عوارض درمانی, سروما

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1448292>

