سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
مسمومیت با جونده کش های ضدانعقاد در دو سگ با علائم چشمی

محل انتشار:
پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:
آرش باقری - *دانشکده دامپزشکی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران*

اصغر وایانی حسنو - *دانشکده دامپزشکی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران*

خلاصه مقاله:
توصیف موارد مشکوک سمیت جونده کش حاوی ضد انعقاد با علائم آشکار عمدتا چشمی . دو مورد سگ که به دلیلناهنجاری های چشمی به کلینیک دامپزشکی مراجعه کرده بودند و مشکوک یا تایید شده ، با مصرف جوندهکش ضد انعقادتشخیص داده شدند. از نظر علایم بالینی مشترک بررسی شدند. علائم شامل خونریزی زیر ملتحمه، اگزوفتالموس، و معمولادرد کره چشم بدون سایر یافتههای معاینه فیزیکی قابل توجه بود. زمان پروترومبین گیری شد (pt) و در همه آنها طولانی بود. زمان ترومبوپلاستین نسبی (ptt) اندازه گیری شد و در همه آنها طولانی بود. شمارش کامل سلول های خونی وپروفایل های شیمیایی سرم، ناهنجاری های خفیف را نشان دادند. سگ ها در معرض جونده کش ضد انعقاد شناخته شدهبودند. هر دو مورد ارجاعی یک شب برای انتقال خون همراه با ویتامین k۱ خوراکی یا تزریقی در کلینیک بستری شدند و هر دو سگ به مدت ۳۰ روز با ویتامین K خوراکی تحت درمان قرار گرفتند. در هر دو سگ طی ۶ هفته پس از شروع درمان، علایم بالینی به طور کامل برطرف شد. پیامدهای سمیت جونده کش ضد انعقاد می تواند با تظاهرات غالبا چشمی تظاهرکند. مصرف جونده کش باید در سگ هایی با خونریزی زیر ملتحمه یک طرفه یا دو طرفه، اگزوفتالموس و درد کره چشم درنظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:
ضد انعقاد، سگ، چشمی، مسمومیت، جونده کش، سمیت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/1455209