

عنوان مقاله:

رابطه تبعیت از درمان با درک از بیماری، خودشفقت ورزشی و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران قلبی عروقی

محل انتشار:

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، دوره 9، شماره 2 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

مهدی پوراسمعیل نیازی - PhD Student, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

فرناز فرشباغ مانی صفت - Assistant Professor, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

علی خادمی - Associate Professor, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

شهلا مشگی - Assistant Professor, Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: تبعیت از درمان یک استراتژی کلیدی در مدیریت بیماری های مزمن است که عوامل مختلفی بر آن تاثیرگذار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای امید به زندگی در رابطه درک از بیماری، خودشفقت ورزشی و حمایت اجتماعی ادراک شده با تبعیت از درمان در بیماران قلبی عروقی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی عروقی مراجعه کننده به مرکز تخصصی قلب شهید مدنی تبریز در بهار ۱۴۰۰ بودند؛ که تعداد ۲۳۴ نفر از آن ها به صورت نمونه های در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل: پرسشنامه درک از بیماری برادبنت، مقیاس - خودشفقت ورزشی ریس، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، امید شنایدر و پرسشنامه تبعیت از درمان مدانلو بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و آزمون سوبل به کمک نرم افزار SPSS و AMOS نسخه ۲۴ استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان دادند که درک از بیماری، خودشفقت ورزشی، حمایت اجتماعی ادراک شده و امید به زندگی بر روی تبعیت از درمان؛ و همچنین درک از بیماری، خودشفقت ورزشی و حمایت اجتماعی ادراک شده بر روی امید به زندگی تاثیر مستقیم و معنادار داشته اند ($p < 0/001$). در ادامه نتایج آزمون سوبل نشان داد که درک از بیماری ($\beta = 0/095$)، خودشفقت ورزشی ($\beta = 0/086$) و حمایت اجتماعی ادراک شده ($\beta = 0/087$) به واسطه امید به زندگی بر روی تبعیت از درمان، تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشته اند ($p < 0/01$). نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که درک از بیماری، خوشفقت ورزشی و حمایت اجتماعی ادراک شده به واسطه امید به زندگی موجب افزایش تبعیت از درمان شده اند. بر این اساس می توان برای آموزش و ارتقای سطح امید به زندگی و به تبع آن افزایش میزان تبعیت از درمان در بیماران قلبی عروقی، اهدافی را تعیین نمود.

کلمات کلیدی:

Treatment adherence, Illness perception, Self-compassion, Perceived social support, Life expectancy
تبعیت از درمان، درک از بیماری، خودشفقت ورزشی، حمایت اجتماعی ادراک شده، امید به زندگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1460485>



