

عنوان مقاله:

مقایسه افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد عادی بر اساس آزمون نوروسایکولوژی استروپ

محل انتشار:

فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، دوره 4، شماره 4 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسنده:

افشان نیک نفس - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش، کیش، ایران

خلاصه مقاله:

ارتباط مغز و روان امری بدیهی است. ابزارهای نوروسایکولوژی کمک شایانی در زمینه ارزیابی کارکردهای شناختی در افراد سالم و بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی و مغزی کرده است. در این پژوهش از آزمون نوروسایکولوژی استروپ استفاده شده است. آزمون استروپ آزمون رایجی برای ارزیابی کارکردهای اجرایی، توجه انتخابی و تمرکز به شمار می رود. در این آزمون، آزمودنی باید رنگ واژه هایی را که با رنگ های مختلف نوشته شده است بدون توجه به معنای آن ها بیان کند این آزمون برای سنجش لوب پیشانی استفاده می شود. در این پژوهش عملکرد افراد دارای اختلال اسکیزوفرنی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است. از اهداف علمی این پژوهش مقایسه عملکرد لوب پیشانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد عادی می باشد. از اهداف کاربردی می توان عنوان کرد که با استفاده از آزمون های نوروسایکولوژی استروپ عملکرد و شدت نواقص شناختی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی را بهتر بشناسیم و این یافته های به دست آمده را می توان در درمان افراد اسکیزوفرنی به کار بریم. درواقع یافته های این پژوهش ما را به سوی درمان بهتر برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی سوق می دهد. روش آماری در این پژوهش پس رویدادی (علی مقایسه ای) است و روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی آن ۳۰ فرد اسکیزوفرنی و ۳۰ فرد عادی انتخاب شده در عملکرد آن ها با استفاده از آزمون استروپ سنجیده شده و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عملکرد افراد مبتلا به اسکیزوفرنی تفاوت بارزی با افراد عادی داشتن که نشان دهنده نقص شناختی در لوب پیشانی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی می باشد.

کلمات کلیدی:

اسکیزوفرنی، آزمون استروپ، نوروسایکولوژی، لوب پیشانی، افراد عادی، نواقص شناختی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1502914>

