

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی کالوس زایی و اندام زایی گردو (Juglans regia L.) رقم چندلر

محل انتشار:

دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی, دوره 3, شماره 2 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

کوثر شیرالی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

پیام پورمحمدی - استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

خلیل عالمی سعید - دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

خلاصه مقاله:

گردو با نام علمی (Juglans regia L.) از خانواده گردوسانان (Juglans regia L.) یکی از گونه های مهم خوراکی در میان خشک میوه ها است. به منظور تعیین بهترین تیمار کالوس زایی و اندام زایی بر روی ریزنمونه ی برگ و جوانه گردو در محیط کشت DKW آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. در آزمایش اول که بر روی ریزنمونه برگ انجام شد، فاکتور اول تنظیم کننده ی رشد ۲۰۲۰ با غلظت های صفر، ۲۰۲۰ میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم که با استفاده از ریزنمونه های جوانه انجام گرفت، تنظیم کننده رشد BAP با غلظت های صفر، ۲۰۱۰ تعلیم کننده رشد DKW با غلظت های صفر، ۵/۲۰ با غلظت های صفر، ۵/۲۰ با غلظت های صفر، ۵/۲۰ با کالوس زایی در محیط کشت DKW حاوی ۳ میلی گرم در لیتر ۶٫۵ در لیتر ۱۳۹۶ و بیشترین میزان قهوه ای شدن برگ در محیط کشت حاوی ۲ میلی گرم در لیتر ۱۳۹۶ و ۴ میلی گرم در لیتر TDZ ایجاد گردید. در آزمایش دوم بیشترین میزان اندام زایی در محیط کشت حاوی ۲ میلی گرم در لیتر ۶٫۵ در لیتر ۱۳۹۶ و ۱۳۹۱ کالوس زایی از ریزنمونه جوانه در محیط کشت DKW حاوی ۳ میلی گرم در لیتر جود داشت. همچنین در تیمار حاوی ۲ میلی گرم در لیتر BAP و ۱ میلی گرم در لیتر جود داشت. همچنین در تیمار حاوی ۲ میلی گرم در لیتر RAP و ۱ میلی گرم در لیتر جود داشت. همچنین در تیمار حاوی ۲ میلی گرم در لیتر BAP کالوس زایی از ریزنمونه جوانه گرد و متیا دشد.

كلمات كليدى:

اکسین, اندام زایی, سایتوکینین, کالوس زایی, گردو

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/1509770

