

عنوان مقاله:

وضعیت پراکندگی بیماری هاری در روباه های قرمز شهر کرمان، اهمیت بهداشت عمومی

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

بهارک اختردانش - گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

پونه حاجی پور - دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

جواد خدری - گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

محیا تکاسی - دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

سینا سلاجقه - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران- دانشجو دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

منصور پورسینا - کرمان، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی

خلاصه مقاله:

روباه از متداول ترین گونه های سگسانان وحشی است که در ایران نسبتا فراوان است و حضور آن از نقاط مختلف تهران، قزوین، فارس، کرمان، خوزستان، بلوچستان، سواحل جنوب ایران، لرستان، آذربایجان، گرگان و خراسان گزارش شده است. نقش سگسانان در بروز بسیاری از بیماری های مشترک در ایران اثبات شده است. روباه ها عامل انتقال بیماریهای مشترک فراوانی هستند که از مهمترین آنها میتوان به سالک احشایی، هاری، کیست هیداتید ناشی از اکی نوکوکوسمولتی لوکولاریس و توکسوکاریزیس، آلودگی به نئوسپورا کنینومو گونه های مختلف تریشنا اشاره نمود. امروزه با تخریب وسیع محیط زیست، حیوانات حیاتوحش به محدوده ی زندگی ما نزدیکتر شدهو طبعاً ممکن است در توزیع گستردهتر و شیوع روزافزون انواع بیماری ها، آنها نقش داشته باشد. بنابراین حیات وحش یکی از اجزای اساسی در اپیدمیولوژی بسیاری از بیماریهای مشترک است. در این تحقیق در طی یک دوره زمانی شش ماهه، از تمام روباه هایی که توسط نیروهای مردمی در محیط های شهری زنده گیری و به دانشکده دامپزشکی ارجاع گردیده بودند (۱۱ قلابه) و همچنین تمام روباه هایزخمی، بیمار و دچار تصادف که توسط نیروهای مردمی و همکاران محیط زیست جهت امداد به دانشکده دامپزشکی ارجاع گردیده بودند (۱۹ قلابه) به عنوان جمعیت مورد مطالعه استفاده شد. تعداد ۱۹ قلابه که به علت تصادف و تروما دچار مشکلات ارتوپدی و آسیب های نخاعی و اعصاب محیطی شدید بودند پس از انجام معاینات بالینی و تایید وخامت اوضاع بالینی با تزریق پروپوفول، آسانکشی شدند. ۵ قلابه از مجموع ۳۰ قلابه روباه (۱۶.۶۶٪) در تست ایمنوکروماتوگرافی و ۳ قلابه از مجموع ۱۹ قلابه (۱۵/۱۷٪) در تست IFA مبتلا بهبیماری هاری بودند که فراوانی بسیار بالایی از آلودگی را نشان میدهد. شیوع بالای بیماری هاری در روباهها، نشان از چرخش احتمالی بیماری در سگهای بلاصاحب را دارد و با توجه به نفوذ قابل توجه جمعیت روباه ها به داخل محوطه ی شهری و افزایش بیرویه جمعیتسگ های بلاصاحب، این امر زنگ خطر بزرگی برای بهداشت عمومی شهر کرمان محسوب می شود.

کلمات کلیدی:

روباه، هاری، بیماریهای مشترک، اپیدمیولوژی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1514890>

