

## عنوان مقاله:

ارزیابی مقایسه ای ریسک ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در پرسنل شاغل در یک محیط درمانی: یک مطالعه میدانی با استفاده از روش آنالیز سریع خطر کووید-۱۹ (RCHA)

## محل انتشار:

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، دوره ۹، شماره ۱ (سال: ۱۴۰۰)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۷

## نویسندگان:

نرگس کایدانی - *Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran*

معصومه کایدانی - *Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Shoushtar University of Medical Sciences, Shoushtar, Iran*

شهرام مولوی نژاد - *Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran*

احمد سلطان زاده - *Department of Occupational Safety and Health Engineering, Research Center for Environmental Pollutants, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran*

## خلاصه مقاله:

مقدمه: ارزیابی ریسک یکی از مهمترین اقداماتی است که نتایج آن می تواند در کاهش میزان شیوع انواع پیامدهای سلامتی در محیط های شغلی اثربخش باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه ریسک ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در پرسنل یک محیط درمانی انجام شده است. روش: این مطالعه یک بررسی مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی بود که در یک بیمارستان در شهر اهواز انجام شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه روش "آنالیز سریع خطر کووید-۱۹" و نمونه مورد مطالعه شامل ۱۹۳ نفر بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار IBM SPSS نسخه ۲۲/۰ انجام شد. یافته ها: بیش از نیمی از افراد از پرسنل پرستاری (۸/۵۱٪) و حدود یک-سوم نیز از مشاغل اداری و خدماتی بودند (۱/۳۰٪). حداقل و حداکثر ریسک ابتلا به این بیماری به ترتیب ۱ و ۶۰۰ برآورد گردید. این نتایج نشان داد سه نفر (۶/۱٪) در ناحیه ریسک قابل قبول، ۵۹ نفر (۶/۳۰٪) در سطح ریسک قابل تحمل و ۱۳۱ نفر (۹/۶۷٪) نیز در ناحیه ریسک غیر قابل قبول قرار گرفته اند. ارزیابی مقایسه ای نشان داد میزان سطح ریسک ابتلا به کووید-۱۹ در چهار گروه شغلی مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار نمی باشد ( $p=0.66/0$ ). نتیجه گیری: یافته های مطالعه بیانگر این بود که سطح ریسک ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در بین پرسنل بخش درمان بالا و در ناحیه غیر قابل قبول قرار دارد. بعلاوه، با وجود تفاوت در سطح ریسک، میزان ریسک در بین گروه های شغلی مختلف دارای اختلاف معنی دار نیست.

## کلمات کلیدی:

(Covid-۱۹, Risk, medical environment, Rapid Covid-۱۹ Hazard Analysis (RCHA), کووید-۱۹، ریسک، محیط درمانی، روش آنالیز سریع خطر کووید-۱۹ (RCHA)

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1521154>



